

C h e m i e.

**Beitrag
zur Kenntnis der Umsetzungsprodukte
des Diphenyl-biphenylen-cyclopentadienons.**

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

genehmigt von der

Philosophischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn.

Von

A u g u s t S c h a e f e r

aus Mühlheim/Main.

Bonn 1936.

Berichterſtatter :
Profeſſor Dr. W. Dillthey.



Meinen Eltern
in Dankbarkeit gewidmet!

Vorliegende Arbeit wurde im Chemischen Institut der Universität Bonn auf Anregung von Herrn Professor Dr. W. Dilthey ausgeführt.

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle meinem hochverehrten Lehrer für das mir erwiesene Wohlwollen und die wertvolle Unterstützung bei der Ausführung dieser Arbeit meinen ergebensten Dank auszusprechen.

INHALTS-VERZEICHNIS.


Theoretischer Teil.

	Seite
Phencyclon und Tetracyclon	7
Malein säureanhydrid-Addukte des Phencyclons	11
Hochphenylierte Benzolderivate	21
Reaktionsprodukte des Phencyclons mit einigen Aminen	26
Reaktionsprodukte des Phencyclons mit einigen Nitrilen und Cyaniden	28

Experimenteller Teil.

Endocarbonyl-3,6-diphenyl-4,5-(0,0'-biphenylen)-dihydrophthal- säureanhydrid und Derivate	29
3,6-Diphenyl-4,5-(0,0'-biphenylen)-dihydrophthal säureanhydrid . .	39
3,6-Diphenyl-4,5-(0,0'-biphenylen)-phthal säureanhydrid	41
1,4-Diphenyl-5,6-(0,0'-biphenylen)-benzol	54
1,2,4-Triphenyl-5,6-(0,0'-biphenylen)-benzol	55
1,2,3,4-Tetraphenyl 5,6-(0,0'-biphenylen)-benzol	57
Pentaphenyl-pyrrol aus Tetracyclon und Nitrobenzol	60
2,3,6-Triphenyl-4,5-(0,0'-biphenylen)-benzoë säure	63
Endocarbonyl-2,3,6-Triphenyl-4,5-(0,0'-biphenylen)-benzoë säure .	65
Phencyclon und Anilin	66
Phencyclon und Monomethylanilin	67
Phencyclon und Dimethylanilin	68
Phencyclon und Chloranilin	69
1,2,5-Triphenyl-3,4-(0,0'-biphenylen)-pyrrol aus Phencyclon und Nitrobenzol	71
2-Benzoyl-3,6-diphenyl-4,5-(0,0'-biphenylen)-pyridin	73

Im Jahre 1930 gelang es W. Diltthey und F. Quint¹⁾ zu zeigen, daß das von K. Ziegler und B. Schnell²⁾ und Löwenbein und Ulich³⁾ fast gleichzeitig erhaltene rote Tetraphenylcyclopentadienon (Tetracyclon) (I) leicht und in guter Ausbeute durch Kondensation von Benzil mit Dibenzylketon mittels alkohol. Alkali dargestellt werden kann:




Später zeigten dann W. Diltthey, J. ter Horst und W. Schommer,⁴⁾ daß diese Reaktion auch auf o-Chinone übertragbar war, indem u. a. Phenanthrenchinon und Acenaphtenchinon sich ebenfalls leicht mit Dibenzylketon zu tieffarbigen Cyclopentadienonen kondensieren ließen. Mit Phenanthrenchinon entstand so das 2,5-Diphenyl-3,4-(o,o'-biphenylen)-cyclopentadienon kurz Phenacyclon (II) und mit Acenaphtenchinon das Acenaphylen-diphenyl-cyclopentadienon, Acecycelon (III)

¹⁾ J. p. Ch. 128, 139—149 (1930).


²⁾ Ann. 445, 266 (1915).

³⁾ Ber. 58, 2662—2667 (1925).

⁴⁾ J. p. Ch. 143, 189 (1935).





Phencyclon (grün)



Acecyclon (blau)

Diese drei tieffarbigen Ketone, die als hauptsächlichliche Vertreter anzusehen sind, scheinen in Bildungsweise und Haupteigenschaften, z. B. in der Farbe, weitgehend als Analoge, zeigen jedoch in ihrem speziellen Verhalten manche Unterschiede, die von Interesse sind, festgehalten zu werden.


Meine Aufgabe war es, das Verhalten von Phencyclon (II) mit dem des Tetracyclons (I) zu vergleichen. Beide Ketone sind gegenüber Oxydations- wie Reduktionsmitteln recht empfindlich. Was die Oxydation betrifft, so bieten sich der Untersuchung erhebliche Schwierigkeiten, die bisher noch nicht haben überwunden werden können. Die Reduktion von I ist Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen. Dabei hat sich gezeigt, daß die Reduktion zwar an der Carbonylgruppe einsetzen kann, wobei ein kirschrote Halochromie gebendes Carbinol (IV) entsteht, daß aber dieses Reduktionsprodukt instabil ist und leicht in einen Dihydrokörper (V) übergeht, der auch durch direkte Kondensation von Dibenzylketon mit Benzoin erhalten wird.



Es ist dies ein sehr stabiles Reduktionsprodukt des Tetracyclons, welches bei zahlreichen Umsetzungsversuchen dieses Ke-

tons mit wasserstoffhaltigen Reaktionspartnern oft in sehr unerwünschter Weise und Menge entsteht.

Dieselbe Stellung, die dieser Dihydrokörper V zum roten Keton (I) einnimmt, hat der Dihydrokörper VI zum grünen Keton (II).



Auch er tritt bei jeder Art von Reduktionsversuch auf, die man am Phencyclon oder seinem Hydrat (VII) vornimmt.


Für dieses Dihydrophenacyclon, das sich durch oxydierende Mittel wieder in Phencyclon verwandeln läßt und somit auch hier in Analogie zur Reihe des Tetraacyclons steht, kommen die Formeln VIa und VIb, die beide ein farbloses Produkt erwarten lassen, in Betracht.

Reduziert man das Hydrat (VII), so können, unter Annahme eines Zwischenprodukts VIc, für das allerdings keine Anhaltspunkte vorliegen, auch die beiden Formen VIa und VIb resultieren, je nachdem, wie Wasser abgespalten wird.

Bei zahlreichen Versuchen mit andern Zielen muß ebenfalls immer mit dem Anfallen des Dihydrophenacyclons (VI) gerechnet werden, besonders dann, wenn man zur Erzwingung eines Umsatzes das grüne Keton mit einem wasserstoffhaltigen Reaktionspartner auf hohe Temperaturen erhitzen muß. Als einziges Reaktionsprodukt faßt man dann häufig diesen Dihydrokörper.

In den beiden farblosen Dihydroderivaten (V und VI) herrscht somit volle Analogie. Daselbe ist der Fall bei den Bromaddukten und besonders auch bei den Hydraten (VII), wie sie in der zitierten Arbeit von W. Dilthey, J. ter Horst und W. Schommer beschrieben sind.


Die Frage nach der Haftstelle der beiden H-Atome im Dihydrokörper konnte zunächst nicht beantwortet werden, bis es gelang



zu zeigen, daß die Cyclopentadienone der Diels-Alder'schen Dien-synthese in 2,5-Stellung zugänglich sind, so daß man auch für die Dihydroverbindungen der Ketone diese, also Formel VIb, als die wahrscheinlichere annehmen darf.

Malein säure - A d d u k t e.


Mit vergleichsweise großer Leichtigkeit geht, wie W. Dilthey, W. Schommer und O. Trösken ¹⁾ gezeigt haben, Tetracyclon mit Malein säureanhydrid eine Diels-Alder'sche Diensynthese ein unter Bildung von Endocarbonyl-tetraphenyl-dihydrophthal säure-anhydrid (VIII):



welches stufenweise zunächst durch CO-Entbindung bei 130—140° in siedendem Chlorbenzol in Tetraphenyl-dihydrophthal säure-anhydrid (IX) und dann bei höherer Temperatur durch Dehydrierung, am besten durch dehydrierende Mittel, in Tetraphenyl-phthal säure-anhydrid (X), Tetralid, übergeführt werden kann.


¹⁾ Ber. 66, 1627.

Ganz dieselbe Reaktion geht auch Phencyclon ein. Es entsteht zuerst das Endocarbonyl 4,5-(o,o'-biphenylen) 3,6-diphenyl-1,2-dihydrophthalisäureanhydrid (XI), und zwar am besten bei der Temperatur des siedenden Chlorbenzols (132°), wobei aber zu bemerken ist, daß diese Addition ohne Lösungsmittel bereits bei 100° oder sogar in siedendem Benzol leicht vorgenommen werden kann; in diesen Fällen ist natürlich längeres Erhitzen notwendig.



Das Anhydrid XI kann mit 50%igem alkohol. Alkali zum Alkalisalz der Endocarbonyl - diphenyl - biphenylen - phthalisäure (XII) verseift werden, eine Säure, die auch durch Erhitzen von Phencyclon mit Maleinsäure in Chlorbenzol zu erhalten ist. Es ist klar, daß die so erhaltene Säure vom Fp. 277—278° die cis-

Form darstellen muß, während durch Addition von Fumar Säure die trans-Form zu erwarten wäre:




Allein es zeigte sich, daß Fumar Säure sich wesentlich schwerer addiert, und beim Versuch, die Reaktion zu erzwingen, schließlich das bei 287° schmelzende Anhydrid, also der Maleinsäureabkömmling, entsteht. Es ist zu vermuten, daß bei länger anhaltendem Erhitzen in Chlorbenzol die Überführung von Fumar Säure in Maleinsäureanhydrid erfolgt, und daß dieses dann die Diensynthese eingeht. Ebenso liegt der Fall bei Maleinsäure. Erhitzt man nämlich Phencyelon zu lange mit Maleinsäure in Chlorbenzol, so erhält man ebenfalls das bei 287° schmelzende Anhydrid.

Bei der Verseifung des Anhydrids (XI) mit alkoholischem Alkali wird neben dem Hauptprodukt von Smp. $276 - 277^{\circ}$ in ganz geringer Menge eine zweite Säure erhalten, die den viel tieferen Fp. 215° aufweist. Es wurde anfangs daran gedacht, diese würde die mögliche trans-Form vorstellen, und es ist auch durchaus nicht von der Hand zu weisen, daß dies so ist. Die Säure F. 215° hat aber eine Molekel H_2O mehr als die Säure F. 276° , entspricht also der Formel $C_{33}H_{24}O_6$ anstatt $C_{33}H_{22}O_6$. Diese H_2O -Molekel hat der Säure nicht genommen werden können, wie auch die Rückverwandlung in das Anhydrid nicht möglich war. Sonderbarerweise läßt sich die tiefer schmelzende Säure auch nicht in die vom Fp. 276° umwandeln, während letztere durch Lösen in wässrigem Alkali und Ausfällen mit HCl glatt in die Säure 215° übergeführt werden kann.

Als Beweis für die Existenz beider Säuren, besonders aber der vom Fp. 215° , kann außerdem noch die Tatsache dienen, daß durch Verseifung des Anhydrids mit wässrigem Alkali


nur letztere erhalten wird. — Eine Formel für die Säure vom Fp. 215° aufzustellen ist noch nicht möglich. —

Im übrigen erweisen sich die Endocarbonylverbindungen als recht beständig. Man kann sie z. B. durch Erhitzen mit Anilin in das Aniliol (XIII)




überführen, also ohne daß eine CO-Entbindung eintritt. Entsprechende Umsetzungen gelangen mit p-Toludin, p-Aminodiphenyl und p-Aminodimethylanilin, während mit p-Nitranilin, Benzidin und anderen keine reinen Produkte erhalten werden konnten. Es handelte sich dabei um Reaktionspartner, die entweder einen relativ hohen Smp. besitzen, oder solche, deren Aminowasserstoffe weniger beweglich erscheinen. In diesen Fällen trat dann zumindest eine nachweisbare CO-Abspaltung ein, außerdem mußte verschiedentlich auf weitere Veränderungen, wie z. B. Dehydrierung geschlossen werden.

Dieselben Schwierigkeiten treten auf bei der Darstellung des 3,6-Diphenyl-4,5-(o,o'-biphenylen)-1,2-dihydrophthal Säureanhydrids (XIV):



In der Reihe des Tetracyclons findet, ausgehend von der Endocarbonylverbindung VIII, durch Erhitzen in Chlorbenzol die CO-Abspaltung zu IX ohne weiteres statt. Bei dem vom Phenyclon sich ableitenden Anhydrid XI stößt man dabei auf die schon erwähnten unerwünschten Veränderungen, da es hierbei nämlich zur Entfernung des CO einer erhöhten Temperatur von mindestens 210—220° bedarf, bei welcher auch schon die Wasserstoffabspaltung beginnt.

Aus diesem Grunde gelingt es nur schwer, die Dihydroverbindung in reinem Zustand zu fassen. Ich konnte zwar dieses Anhydrid durch 30-stündiges Erhitzen des Endocarbonylproduktes XI in siedendem Naphtalin erhalten, doch läßt die Analyse, soweit eine solche in diesem Falle überhaupt eine Entscheidung bringen kann, zu wünschen übrig; außerdem ist der Smp. 298—300° nicht besonders scharf. Tiefer siedende Lösungsmittel bewirken keine Veränderung der Endocarbonylverbindung, während mit Nitrobenzol gleichzeitig Dehydrierung zum 3,6-Diphenyl-4,5-(o,o'-biphenylen)-phthaläureanhydrid (XV) eintrat.



Bei der Darstellung dieses Anhydrids auf dem beschriebenen Wege muß zwar das Auftreten des Dihydroanhydrids (XIV) als Zwischenprodukt angenommen werden, aber es ließ sich trotz mehrerer Proben, die alle 2 Stunden entnommen wurden, nicht identifizieren.

Die Schmelze des Endocarbonylprodukts (XI) liefert ebenfalls kein mikroskopisch reines Produkt. Das Schmelzgut gibt zwar, wenn es nach Zusatz von Schwefel oder Selen weitererhitzt wird, H_2S ab, ein Zeichen, daß der Dihydrokörper (XIV) vorhanden ist, aber es ist jedenfalls auch schon das dehydrierte Produkt (XV) zugegen, wie an den verschiedenen Kristallformen erkannt werden kann.


Das Diphenyl-biphenyl-dihydrophthaläure-anhydrid (XIV) konnten wir wegen der geringen Menge und dem zweifelhaften Reinheitsgrad nicht weiter untersuchen.




Das Diphenyl - biphenyl - phthaläureanhydrid (XV) oder Phenphthalid läßt sich mit alkohol. Alkali zu der entsprechenden Dicarbonsäure (XVI) verseifen.





Außerdem setzt es sich leicht um mit Anilin, p-Toluidin, p-Aminodimethylanilin, Benzidin, o-Phenylendiamin und 1,8-Naphthylendiamin. Die erhaltenen Produkte zeigen mehr oder weniger starke Färbung und verdienen deshalb einiges Interesse.

In der folgenden Tabelle sind sie nach der Intensität der Farbe geordnet. Der eigentliche Grundkörper, das Diphenylbiphenylenphthalimid konnte leider nicht rein erhalten werden; das Rohprodukt, das zwischen 335 und 340° schmilzt, zeigt orangefarbene Halochromie.

	Fp.	Eigenfarbe	Lösungsfarbe in Benzol	Farbe in conc. H ₂ SO ₄
 XVII	358 ₀	schwachgelb	schwachgelb	schwach gelb, bei starker Erwärmung orangegelb

	Fp.	Eigen- farbe	Lösungs- farbe in Benzol	Farbe in conc. H ₂ SO ₄
 XVIII	341°	schwach- gelb	schwach- gelb	orange-rot
 XIX	338°	orange	orange	rot
 XX	361°	gelb- grün	gelb	schwach orange


	Fp.	Eigen- farbe	Lösungs- farbe in Benzol	Farbe in conc. H ₂ SO ₄
 XXI	312°	leuchtend gelb	gelb	leuchtend rot
 XXII	319°	rot	rot	tiefrot

Der Schmelzpunktabfall Anilid-Toluidid tritt auch in der Reihe der Endocarbonylverbindungen (XI) auf.

Befonderes Interesse verdient das tiefrote Diphenyl-biphenylen-phthaloperinon (XXII), das durch Kondensation des Anhydrids (XV) mit 1,8-Naphtylendiamin erhalten wurde und sich durch Farbe und Echtheit auszeichnet. Nachdem wir es zunächst durch Zusammenschmelzen dargestellt hatten, wurde die Darstellung später nach dem Verfahren von F. Sachs¹⁾ in der Phtaljäure-Reihe abgeändert. Durch Kondensation in Toluol erhält man ein hellerfarbiges Produkt, das keinen eigenen

¹⁾ Ann. 365, 53 ff. (1909).


Schmelzpunkt besitzt, sondern beim Erhitzen eine tiefere Farbe annimmt und bei 319° , also der Schmelztemperatur des Perinons, schmilzt. Es handelt sich dabei um die 3,6-Diphenyl-4,5-biphenylen-perimidy-2-o-benzoë Säure (XXIII), die durch einen zweiten Ringluß, indem die Carboxylgruppe mit dem Imidwasserstoff unter Bildung eines 5-Rings Wasser abspaltet, das Perinon (XXII) bildet:



Wie schon in der Reihe der Tetraphenylphthaläure ¹⁾ gezeigt wurde, wird die Reaktionsfähigkeit der Carboxylgruppen durch die Häufung der Phenylkerne stark herabgesetzt, was sich beispielsweise an der erschwerten Esterifizierung erkennen läßt. Da-

¹⁾ W. Diltney, J. Thewalt und O. Trösken, Ber. 67, 1959 (1934).

gegen zeigt sich eine große intramolekulare Reaktionsfähigkeit, indem die Carboxylgruppen unter Einwirkung von AlCl_3 , PCl_5 usw. mit den benachbarten Phenylkernen Wasser abspalten unter Bildung einer Fluorenon-monocarbonsäure (XXIV) bzw. eines Difluorenons (XXV):




Die Fluorennonmonocarbonsäure löst sich kaum in verdünnten Alkalien, das Difluorennon überhaupt nicht. Ein weiterer Unterschied besteht in der Farbe, die bei letzterem wesentlich tiefer ist. Auffallend ist, daß der zweite Ringschluß von XXIV zu XXV nur sehr schwer, erst durch Schmelzen des Anhydrids bzw. der Fluorennonmonocarbonsäure mit AlCl_3 erfolgt.

Hochphenylierte Benzolderivate.

Wie schon früher von W. Dilthey, W. Schommer und O. Trösken¹⁾ mitgeteilt wurde, reagieren die tieffarbigen Cyclopentadienone nicht nur mit Äthylen-, sondern auch mit Acetylenkörpern. Im Gegensatz zu den Addukten mit Maleinsäureanhydrid findet mit Acetylenen nach unsern Beobachtungen fast stets CO -Entbindung statt unter Bildung hochphenylierter Benzolderivate.


¹⁾ B. 66, 1627 (1933).

Der Grundkörper dieser Reihe, das Diphenyl-biphenylen-benzol (XXVI) aus Phencyclon und Acetylen,




konnte weder durch Einleiten von Acetylen, in eine Schmelze noch in eine Lösung des Ketons in Chlorbenzol erhalten werden. Im ersten Falle zeigten sich Schmierer, die auf Zerstörung des Ketons zurückgeführt werden müssen, während andererseits die Siedetemperatur des Chlorbenzols nicht hoch genug erscheint.

Wesentlich leichter gestaltet sich die Darstellung des Triphenyl-biphenylen-benzols (XXVII) aus Phencyclon und Phenylacetylen, das sich schon in der Kälte bildet.



Versuche zur Darstellung der entsprechenden Endocarbonylverbindung führten stets zu dem CO-freien Produkt. Während also bei den Addukten mit Maleinsäureanhydrid die CO-Entbindung erst bei relativ hoher Temperatur einsetzt, findet sie mit Phenylacetylen schon bei Zimmertemperatur innerhalb weniger Stunden statt.

Das Tetraphenyl-biphenylen-benzol (XXVIII) läßt sich leicht aus Phencyclon + Tolan im Sinne folgender Gleichung synthetisieren:



während beim Versuch der Darstellung des entsprechenden Endocarbonylkörpers ein Produkt erhalten wurde, das sich durch wesentlich tieferen C-Gehalt und unerwartete Halochromie von dem gesuchten unterscheidet. Es handelt sich scheinbar um eine Verbindung mit mehr Sauerstoff, über deren Konstitution sich zur Zeit aber noch nichts Genaueres aussagen läßt.


Beim Vergleich der Schmelzpunkte dieser hochphenylierten Benzolderivate mit den entsprechenden der Tetracyclonreihe

Tetraphenylbenzol	191°	Diphenylbiphenylenbenzol	—
Pentaphenylbenzol	246—247°	Triphenylbiphenylenbenzol	250°
Hexaphenylbenzol	426—427°	Tetraphenylbiphenylenbenzol	293°

fällt die große Schmelzpunktdifferenz der beiden höchstphenylierten auf. Sie wird vielleicht erklärlich, wenn man beachtet,

daß das Hexaphenylbenzol vollkommen gleichmäßig aufgebaut ist, was beim Tetraphenylbiphenylenbenzol nicht in diesem Maße der Fall ist.

Im Gegensatz zu den erwähnten Reaktionsprodukten des grünen Ketons mit Acetylenkörper führt der Umsatz mit Phenylpropionsäure auch zu einer Endocarbonylverbindung:




Es zeigte sich, daß der Endocarbonylkörper (XXX) wesentlich leichter darstellbar ist, als das CO-freie Produkt (XXIX), welches nur unter Innehaltung ganz bestimmter Temperatur rein zu erhalten ist. Die Tatsache, daß bei den Umsetzungen des Ketons mit Acetylenen ein Erhitzen auf relativ hohe Temperaturen meist unumgänglich ist, macht sich hier insofern unange-

nehm bemerkbar, als bei zu langem oder zu starkem Erhitzen die Phenylpropionlsäure unter Decarboxylierung in Phenylacetylen übergeht, wodurch Triphenylbiphenylenbenzol (XXVII) gebildet wird. Auf der anderen Seite ist zur Entfernung der CO-Gruppe (aus XXX) eine bestimmte Temperatur nötig, da sonst ein Gemisch der beiden Monocarbonsäuren entsteht.

Sehr interessant ist die Möglichkeit, das Endocarbonylprodukt durch Erhitzen unter CO-Entbindung in die entsprechende CO-freie Verbindung XXIX überzuführen, eine Umwandlung, die quantitativ verläuft.

Diese leichte Verwandlung gibt Veranlassung, die Formel XXX für das Addukt vorzuschlagen, nach welcher eine Endocarbonyl-monocarbonsäure vorliegt. Als Säure müßte das Addukt in Alkalien, wenn auch, des hohen Molekular-Gewichts wegen, schwer löslich sein. Diese Löslichkeit in Alkalien ist aber bei XXX nicht vorhanden, während die Säure XXIX sogar in Ammoniak leicht löslich ist. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß XXX durch eine Addition unter Beteiligung oder Veränderung der Carboxylgruppe entstanden ist, indem diese mit der Carbonylgruppe entsprechend der Formel XXXI in Reaktion getreten ist:



Eine Entscheidung hierüber wird vielleicht getroffen werden können, wenn die Addukte des grünen Ketons mit anderen Säuren oder Phenolen näher untersucht sind.


Das Phencyclon addiert nämlich eine große Anzahl von Produkten, die Sauerstoff oder Stickstoff enthalten.

Es wurde eine Reihe von Versuchen angestellt, jedoch können nur die Addukte mit aromatischen Aminen näher beschrieben werden.

Löst man Phencyclon (II) unter Erwärmen im Stickstoffstrom in reinem Anilin, so verschwindet die grüne Farbe ziemlich rasch, und beim Erkalten kristallisiert eine farblose Substanz aus, die durch Umkristallisieren gereinigt werden kann und in reinem Zustand bei 233-234° schmilzt. Ihre Analyse stimmt auf einen Körper aus 1 Mol Keton + 1 Mol Anilin. Dabei handelt es sich um eine lockere Addition, denn mit conc. H₂SO₄ erscheint die grüne Halochromie des Phencyclons, und beim Eingießen dieser Lösung in Wasser fällt das farblose Hydrat des grünen Ketons aus.

Die Konstitution des Adduktes ist schwer feststellbar. Aus dem Rückgang der Farbe ist nur zu entnehmen, daß die Addition entweder die CO-Gruppe oder die Lücken der C-Atome in Mitleidenchaft gezogen hat, da jede Veränderung am O-Atom oder an den C-Atomen Farblosigkeit zur Folge hat. An welchen Stellen die Addition nun tatsächlich eintritt, ist nur auf Grund von Analogieschlüssen zu folgern.



Bevorzugt scheinen die Enden des konjugierten Systems, also die C-Atome 2 und 5, oder, wenn man den Sauerstoff einbezieht, dieser und das C-Atom 2 oder 5:




Die Formeln XXXII und XXXIII kämen in Betracht, wenn von seiten des Amins die Aminogruppe die Addition vermitteln

würde. Hierauf könnte man insofern schließen, als im Addukt keine freie Aminogruppe, auch nicht mit salpetriger Säure, mehr nachzuweisen ist.

Es müssen aber auch noch andere Möglichkeiten einer Addition vorliegen, denn auch Dimethylanilin gibt, neben viel Dihydrophencyclon, ein N-haltiges, farbloses Addukt, das nun entweder durch Mitwirkung des reaktionsfähigen paraständigen H-Atoms entstehen kann, z. B.



oder aber es müßte eine Diensynthese mit einer Aethylenlücke des Dimethylanilins erfolgen, z. B.:




zu einem System, das sich leicht durch Dehydrierung und Decarbonylierung in ein Diphenyl-biphenylen- α -Naphylamin-Derivat überführen lassen müßte. Als Wasserstoff-Acceptor käme bei der Dehydrierung grünes Keton selbst in Frage, und so würde sich vielleicht die Tatsache erklären, daß bei diesen Additionsreaktionen stets in wechselnder Menge der Dihydrokörper des Phencyclons anfällt. Da aber ein solches Addukt mit Dimethylanilin keine basischen Eigenschaften mehr verrät, bleibt die Konstitution dieser Verbindungen noch problematisch.

Versuche, das grüne Keton mit Nitrilen umzusetzen, führten zu verschiedenen Ergebnissen. Benzonitril z. B. scheint nur sehr langsam zu reagieren zu Triphenyl-biphenylen-pyridin, wobei, besonders bei zu langem Erhitzen, starke Zersetzung eintritt. Das Phentaphenyl-pyridin, aus Tetracyclon und Benzonitril, ließ sich wesentlich leichter durch 6-stündiges Erhitzen auf 270—300° im geschlossenen Rohr darstellen.

Mit Acetonitril tritt eine Reaktion noch weniger ein, was durch die tiefe Siedetemperatur des Nitrils erklärlich wird.

Beim Umsatz mit Benzoylcyanid stößt man auf die früher schon erwähnte Tatsache, daß das Phencyclon leicht mit wasserstoffhaltigen Reaktionspartnern unter Bildung von Dihydrophencyclon reagiert, was also auch hier an Stelle des erwarteten Benzyl-diphenyl-biphenylenpyridins erhalten wurde. — Ebenso liegt der Fall bei Reaktionsversuchen mit Benzalanilin.


Mit Benzoylcyanid lieferte das Keton einen Körper, dessen Analyse auf 2-Benzoyl-3,6-diphenyl-4,5-biphenylenpyridin (XXXVII) stimmt:



Bei Reaktionsversuchen mit Azobenzol wurde nach längerem Erhitzen neben viel Schmierem nicht umgesetztes Azobenzol erhalten, weshalb man auf eine Zersetzung des Phencyclons schließen muß, eine Erscheinung, die auch in anderen Fällen, z. B. mit Benzonitril, eintrat.

Experimenteller Teil.

**Endocarbonyl-3,6-diphenyl-4,5-(o,o'-biphenyl)-
dihydrophthalsäureanhydrid**
durch Diensynthese aus Phencyclon + Maleinsäureanhydrid.



Die Darstellung dieses Anhydrids (Anhydrid I) kann nach verschiedenen Methoden vorgenommen werden:


- 1) Durch Erhitzen der beiden Komponenten im Trockenschrank auf ca. 100° (Dissert. ter Horst.)
- 2) Durch Erhitzen in Benzol am Rückflußkühler. Die grüne Farbe verschwindet nach einigen Stunden, und man erhält ein schwach grün gefärbtes Produkt, das durch Waschen mit Methylalkohol fast farblos wird. Der Smp. des Rohproduktes liegt zwischen 281 und 284°.

3) Am besten nimmt man die Umsetzung in Chlorbenzol vor. 5,7 g Phencyclon werden mit 1,5 g Maleinsäureanhydrid so lange in Chlorbenzol erhitzt, bis die grüne Farbe völlig verschwunden ist; dann wird erkalten gelassen, filtriert und gut mit Methylalkohol gewaschen. Das Rohprodukt schmilzt bei 286° und kann ungereinigt zu weiteren Umsetzungen verwendet werden. — Zur Reinigung nimmt man in viel Benzol auf und fällt vorsichtig mit Benzin. Das reine Produkt schmilzt bei $286-287^{\circ}$ unter starker Gasentwicklung und Grünfärbung. Mit conc. Schwefelsäure tritt keine Färbung ein.

A n a l y s e :

0,1907 g Subst.:	0,5766 g CO_2 ;	0,0722 g H_2O
Gef.:	82,46% C	4,24% H
Ber.: $\text{C}_{38}\text{H}_{20}\text{O}_4$	82,47% C	4,20% H.

**Endocarbonyl-3,6-diphenyl-4,5-biphenylen-dihydrophthal-
säure.**



1) Durch Verseifung des Anhydrids mit alkoholischem Alkali: Man löst das Anhydrid I in viel 50%iger alkoholischer Kalilauge und läßt in die siedende gelbe Lösung unter stetigem Schütteln conc. HCl eintropfen. Dabei verschwindet die

gelbe Farbe, und es scheidet sich ein farbloser Körper in großen Flocken ab. Nach dem Erkalten, bei dem sich die Flocken zusammenballen, und einigem Absetzen wird filtriert und gut mit Wasser ausgewaschen. Man kocht das erhaltene getrocknete Rohprodukt zunächst mit Benzol aus, wodurch ein geringer Teil gelöst wird, und nimmt dann die Hauptmenge in Toluol auf. Nach hinreichendem Einengen scheidet sich ein schön kristallines Produkt ab, das bei $276-277^{\circ}$ unter Gasentwicklung schmilzt.

Der Körper ist in conc. H_2SO_4 in der Kälte unlöslich; beim Erhitzen tritt Gelbfärbung ein.

Die Löslichkeit in Alkohol ist sehr groß; durch Wasser kann der Körper wieder ausgefällt werden.

Aus dem oben erwähnten Benzol-Auszug scheidet sich ein Produkt ab, das zwischen 210 und 215° unter Gasentwicklung schmilzt. Es zeigt gelbe Halochromie, die beim Erwärmen in weinrot übergeht, und ist in Alkohol sowie in Alkohol + Alkali löslich. Beim Liegen am Licht, besonders aber an der Luft, tritt bald Gelbfärbung ein. — Nach Beobachtungen, die im Folgenden wiedergegeben werden, handelt es sich hierbei um ein H_2O -haltiges Produkt.

- 2) Verseifung von Anhydrid I in wässrigem Alkali: Nach der oben angegebenen Methode wurden 5 g Anhydrid mit wässriger Kalilauge verseift und 4,9 g eines zwischen 205 und 210° schmelzenden Körpers erhalten. Nach dem Umkristallisieren aus Benzol lag der Smp. bei 214° . — Das Produkt zeigt in der Kälte gelbe, beim Erhitzen eine rote Halochromie.

Der Mischschmelzpunkt mit dem bei 276° schmelzenden Produkt zeigt keine ausgesprochene Depression; bei 212° beginnt ein Sintern, ein Teil schmilzt, die Probe ist aber erst bei $270-275^{\circ}$ durchgeschmolzen.

Bei der Verseifung mit wässriger KOH erhält man also als Hauptprodukt einen Körper, der bei alkoholischer Verseifung — wohl infolge geringen Wassergehaltes der Alkalilösung — nur in ganz geringer Menge auftritt.

Analysen des Produktes 215:

1. 4,930 mg Subst.: 13,945 mg CO₂; 2,250 mg H₂O ¹⁾
 = 77,14% C = 5,08% H

2) 53,75 mg Subst.: 150,68 mg CO₂; 26,62 mg H₂O ²⁾
 = 76,45% C = 5,54% H

Diese Werte lassen in ihrem Mittel eine Verbindung C₃₃H₂₄O₆ zu, also C₃₃H₂₂O₆ + 1 H₂O, für die 76,75% C und 4,65% H berechnet werden.

Die Substanz zur Analyse ¹⁾ war im Hochvakuum bei Zimmertemperatur getrocknet. Ein Trocknen bei 150° bei Normaldruck verursachte keine Gewichtsveränderung!

3) Durch Addition von Maleinsäure an Phencyclon (Dien-synthese): 3 g Phencyclon werden mit 1 g Maleinsäure gut gemischt und in Chlorbenzol zum Sieden erhitzt. Schon nach kurzer Zeit ist eine schwache Aufhellung der zunächst tiefgrünen Farbe zu erkennen, während sich gleichzeitig an der Wandung des Gefäßes ein helles Produkt abscheidet. Nach insgesamt 20 Minuten langem Kochen ist die Reaktion beendet. Man läßt erkalten, filtriert und wäscht mit Methylalkohol. Das erhaltene oft direkt kristalline Produkt schmilzt bei 276° unter starker Gasentwicklung. Durch Umkristallisieren aus Toluol steigt der Smp. auf 277-278°.

Das Produkt zeigt mit conc. Schwefelsäure keine Halochromie; in der Hitze tritt schwache Gelbfärbung ein.

Der Mischschmelzpunkt mit dem durch Verseifung von Anhydrid I mit alkoholischem Alkali erhaltenen Produkt zeigt keine Depression.

Ausbeute: 3,7 g.

¹⁾ Dr. Schoeller.

²⁾ cand. chem. Heinen, Bonn.

Analyse:

	0,1976 g Subst.:	0,5749 g CO ₂ ,	0,0798 g H ₂ O
	Gef:	79,35% C	4,52% H
C ₃₃ H ₂₂ O ₅	Ber.:	79,49% C	4,45% H

Eine Probe des bei 277° schmelzenden Körpers wurde in wässriger NaOH, der etwas Alkohol zugesetzt war, gelöst und die Lösung mit HCl angeäuert. Das ausfallende Produkt schmolz bei 212°, nach dem Umkristallisieren bei 216°, und löste sich unter Gelbfärbung in conc. H₂SO₄. Eine Schmelzpunktdepression mit dem weiter oben beschriebenen Körper 215° trat nicht ein. Umgekehrt ließ sich das tief schmelzende Produkt durch Lösen in alkohol. Alkali und Fällen mit HCl conc. nicht in den bei 276—277° schmelzenden Körper überführen.


Erhitzt man Pheneyclon + Maleinsäure zu lange in Chlorbenzol oder einem anderen hochsiedenden Lösungsmittel, so erhält man durch Wasserabspaltung statt der Säure das bei 287° schmelzende Anhydrid!

4) Analog dem Versuch mit Maleinsäure wurden 3 g Pheneyclon mit 1 g Fumar säure in Chlorbenzol erhitzt. Hier geht die Reaktion wesentlich langsamer vonstatten, und erst nach 5-stündigem Sieden ist ein heileres Produkt erkennbar. Auch behält die Lösung, im Gegensatz zu den Versuchen mit Maleinsäureanhydrid und Maleinsäure, ihre dunkle Farbe, zumindest läßt sich nur eine ganz geringe Aufhellung feststellen. Nach dem Erkalten wurden 100 ccm Methylalkohol zugesetzt und 10 Stunden stehengelassen. Danach hatte sich ein schwach gelb gefärbtes Produkt abgesetzt, das in Benzol aufgenommen wurde. Nach Zugabe von Ligroin schied sich ein farbloser Körper ab, der bei 286° schmolz und sich mit dem schon beschriebenen Anhydrid identisch erwies.

Entsprechende Versuche in tiefer siedenden Lösungsmitteln führten in Toluol nach 36 und in Benzol nach 50 Stunden zu dem gleichen Endprodukt.

Bei dem langen Erhitzen findet also eine Wasserabspaltung statt, verbunden mit der Umlagerung von Fumar säure in Maleinsäureanhydrid, und erst dann tritt die Addition ein.

**Endocarbonyl-3,6-diphenyl-4,5-(o,o'-biphenyl)-
dihydrophthal säure-anilid.**



3 g Anhydrid I werden mit einem Überschuß frisch destillierten Anilins langsam erhitzt, wobei zwischen 120 und 130° eine Lösung entsteht. Bei beginnendem Sieden wird das Erhitzen abgebrochen, da die Endocarbonylverbindung leicht zerstörbar ist. Man läßt erkalten, wobei sich ein fast farbloses kristallines Produkt vom Smp. 292° abscheidet. Aus dem Filtrat läßt sich mittels Methylalkohols noch eine größere Menge des Körpers, allerdings in weniger reiner Form, abscheiden. Nach dem Umkristallisieren aus Benzol zeigen beide Teile den Smp. 293-294°.

Mit conc. H₂SO₄ tritt keine Färbung ein.

Ausbeute 90 %

A n a l y s e:


0,2054 g Subst: 0,6372 g CO₂, 0,0854 g H₂O

0,1454 g „ 3,25 ccm N (24°, 756 mm)

Gef.: 84,61% C 4,64% H, 2,55% N

Ber.: C₃₉H₂₅O₃N 84,29% C 4,54% H, 2,52% N.

Endocarbonyl-3,6-diphenyl-4,5-(o,o'-biphenylen)-
dihydrophthalj Säure-toluidid.



Man erhitzt 3 g Anhydrid I mit 3 g p-Toluidin in einem Kölbchen in CO_2 -Atmosphäre langsam auf 180° , wodurch eine grünlichbraune Schmelze entsteht, die beim Erkalten zu einer blättrigen Masse erstarrt. Diese wird pulverisiert, zur Entfernung überschüssigen Toluidins mit Methanol ausgekocht, und der Rückstand in Benzol aufgenommen. Durch Zugabe von Methylalkohol scheiden sich schön ausgebildete farblose Kristalle ab, die nach nochmaligem Umlösen konstant bei $270\text{--}271^\circ$ unter Gasentwicklung schmelzen, nachdem bei 266° eine Gelbfärbung eintritt.

Das Produkt ist in kalter H_2SO_4 conc. unlöslich; beim Erwärmen tritt bald Braunfärbung ein.


Ausbeute: 89 %.

Stickstoff-Bestimmung:

$$3,073 \text{ mg Subst.: } 0,074 \text{ cm}^3 \text{ N}_2 \left(\frac{753}{25} \right) \\ = 2,73\% \text{ N}$$

Für $\text{C}_{40}\text{H}_{27}\text{O}_3\text{N}$ ber: 2,46% N.

Kondensation von Endocarbonyl-diphenyl-biphenylen-dihydro-phtal Säure-anhydrid mit p-Amino-dimethyl-anilin.



1) 3 g Anhydrid I wurden mit der gleichen Menge Amin in einem Kölbchen in CO_2 -Atmosphäre erhitzt. Bei 140° setzte eine schwache Reaktion ein, die zu einer rotbraunen, klaren Lösung führte. Beim Erkalten entstand ein Brei, aus dem mit Methylalkohol ein gelb gefärbtes Produkt erhalten werden konnte. Aus Benzol umkristallisiert, war deutlich ein Gemisch eines farblosen mit einem gelben Körper zu erkennen, in dem letzterer die Hauptmenge ausmachte.

In conc. H_2SO_4 blieb ein Teil ungelöst, während sich ein anderer unter Rotfärbung löste.

Es handelt sich dabei um ein Gemisch der gesuchten Endocarbonylverbindung mit einer CO-freien.

2) In einem zweiten Versuch wurden die Reaktionsteilnehmer im Trockenschrank 2 Stunden lang bei ca. 100° gehalten, die entstandene rotbraune Masse erkalten gelassen, der gebildete Brei mit Methanol verrührt und das flockige Produkt nach einigem Absetzen filtriert. Danach war der Körper noch violett gefärbt. Nachdem der Rückstand zur Entfernung des überschüssigenamins, bzw. seiner Zerfallsprodukte, mit Alkohol ausgekocht war, wurde das nun wesentlich heller gefärbte Rohprodukt aus Benzol umkristallisiert. Es schieden sich quadrat. Plättchen ab, die zwischen 296 und 298° schmelzen.


Der Körper behielt trotz mehrmaligen Umkristallisierens eine schwach violette Färbung, die wahrscheinlich auf Oxydationsprodukte des Amins zurückzuführen ist. Es handelt sich jedoch nur um Oberflächenfarbe; die Färbung in Benzol und anderen Lösungsmitteln ist kaum zu erkennen.

In kalter Schwefelsäure unlöslich, zeigt das Produkt beim Erwärmen eine schwache Gelbfärbung.

Stickstoff-Bestimmung:

2,792 mg Subst.: $0,124 \text{ cm}^3 \text{ N}_2 \text{ (}^{753}/_{24}\text{)} = 5,05\% \text{ N}$
Für $\text{C}_{41}\text{H}_{80}\text{O}_3\text{N}_2$ berechnet: $4,68\% \text{ N}$.

Kondensation von Endocarbonyl-3,6-diphenyl-4,5-biphenylen-dihydro-phthaläureanhydrid mit p-Amino-diphenyl.



2 g Anhydrid I werden mit 5 g p-Aminodiphenyl gut gemischt und in einem Kölbchen im Trockenschrank (ca. 100°) erwärmt. Schon nach kurzer Zeit nachdem das Amin geschmolzen ist (49°), erhält man einen gelb-braunen Brei, in dem zunächst noch Spuren des farblosen Anhydrids zu erkennen sind. Nach 1 Stunde ist das gesamte Anhydrid umgesetzt, und es bleibt eine etwas festere, homogene Masse. Wird diese mit Methylalkohol verrührt, so erhält man fast farblose Flocken, die in Benzol aufgenommen werden. Nach starkem Einengen und Zusatz einiger

Tropfen hochsiedenden Ligroins scheidet sich nach einigem Stehen ein farbloses Produkt ab, das bei 273^0 unter Gasentwicklung schmilzt.

In conc. Schwefelsäure löst sich der Körper erst beim Erwärmen unter schwacher Gelbfärbung.

In ungereinigtem Zustand verfärbt sich das Produkt bei längerem Stehen an der Luft.

A n a l y s e :

5,212 mg Subst.: 16,365 mg CO_2 , 2,250 mg H_2O

3,22 mg „ 0,070 ccm N_2 ($^{755}/_{25}$)

Gef.: 85,63% C, 4,83% H, 2,47% N.

Ber.: $\text{C}_{45}\text{H}_{29}\text{O}_8\text{N}$ 85,55% C, 4,63% H, 2,22% N.

Es wurde versucht, durch Einleiten von NH_3 in das geschmolzene Anhydrid I dessen Imid herzustellen, doch gelang es nicht, ein reines Produkt zu erhalten. Ebenso verhielt es sich bei anderen Schmelzversuchen, wie sie vorgenommen wurden mit:

1,8-Naphtylen-diamin

o-Phenylendiamin

1-Amino-7-naphtol

Benzidin


p-Amino-phenol

p-Nitranilin

p-Amino-benzoëlsäure

Bei all diesen Versuchen erhält man stets Gemische, da das Anhydrid beim Schmelzen nicht nur die Endocarbonylgruppe verliert, sondern scheinbar auch noch andere Veränderungen erleidet. Bei verschiedenen Ansätzen mit gleichen Reaktionspartnern und genauer Innehaltung von Temperatur usw. wurden Produkte erhalten, die Schmelzpunktunterschiede bis zu 15 Grad zeigten.

3,6-Diphenyl-4,5-biphenylen-dihydro-phthaljäureanhydrid.



Anhydrid II

Zur Darstellung dieses Anhydrids wurde das schon früher erwähnte Endocarbonyl-diphenyl-biphenylen-dihydrophthaljäureanhydrid im Salzbad zum Schmelzen gebracht, und zwar so, daß die Temp. 290° nicht überstieg. Die zunächst starke Gasentwicklung wurde dabei nach wenigen Minuten schwächer, um nach ca. 30 Minuten ganz aufzuhören. Das erhaltene Produkt zeigte nach dem Reinigen den Smp. 347° und erwies sich identisch mit dem unten beschriebenen Diphenyl-biphenylen-phthaljäureanhydrid. Es hatte demnach nicht nur eine CO-Entbindung stattgefunden, sondern anschließend an diese waren, trotz Innehaltung der oben angegebenen Temperatur, die beiden H-Atome abgespalten worden.

Durch Erhitzen von Endocarbonyl-diphenyl-biphenylen-dihydrophthaljäureanhydrid in Chlorbenzol oder o-Dichlorbenzol trat keine Veränderung ein.

Schließlich gelang die Darstellung durch 30-stündiges Kochen von 3 g Endocarbonyl-diphenyl-biphenylen-dihydrophthaljäureanhydrid in 10 g Naphtalin. Nachdem letzteres mittels Äther entfernt war, wurde das gelbe Produkt aus Benzol umkristallisiert, wodurch wir einen schwach gelb gefärbten Körper vom Smp. $298-300^{\circ}$ erhielten.

Das Produkt zeigt mit conc. Schwefelsäure keine Halochromie. — Es löst sich in Ammoniak + wenig Alkohol ziemlich leicht;

durch Zusatz von Essigsäure, nicht aber durch Wasser, tritt Fällung ein.

Analysis:

4,750 mg Subst.:	14,840 mg CO ₂ ,	2,060 mg H ₂ O
Gef.:	85,21% C,	4,85% H
Ber.: C ₃₂ H ₂₀ O ₃	84,96% C,	4,43% H

Die Darstellung dieses Anhydrids ist insofern schwierig, als man sehr leicht Gemische der drei möglichen Anhydride erhält, nämlich:


- I) Endocarbonyl-diphenyl-biphenylen-dihydrophthal säureanhydrid (Anhydrid I)
- II) Diphenyl-biphenylen-dihydrophthal säureanhydrid (Anhydrid II),
- III) Diphenyl-biphenylen-phthal säureanhydrid (Anhydrid III),

die sich durch Umkristallisieren nicht voneinander trennen lassen.

In Analogie hierzu steht die Darstellung von Anhydrid III durch Erhitzen von Anhydrid I in Nitrobenzol, wobei das Anhydrid II wahrscheinlich als Zwischenprodukt auftritt. Es konnte in diesem Falle jedoch trotz verschiedener Proben nicht isoliert werden, sondern man erhält stets Gemische, deren Smp. zwischen 295 und 330° schwankt, bis schließlich nach längerem Erhitzen als Endprodukt das Anhydrid III vorlag.

Neben diesen drei gefaßten Anhydriden muß noch ein viertes möglich sein, das Endocarbonyl-diphenyl-biphenylen-phthal säureanhydrid, das wir durch Erhitzen von Anhydrid I mit AlCl₃ in Benzol zu erhalten versuchten. Trotz verschiedener Ansätze mit 2, 3, 5 und 7 Mol. AlCl₃ trat keine Veränderung ein, und ich erhielt stets das Ausgangsanhydrid zurück.

3,6-Diphenyl-4,5-(o,o'-biphenylen)-phtalfäureanhydrid.



1) Die Darstellung dieses Anhydrids wurde zunächst durch einfaches Schmelzen von Anhydrid I (Smp. 287⁰) versucht, indem dieses im Salzbad zum Schmelzen gebracht, und schließlich die Temperatur nach beendeter Gasentwicklung auf 300—310⁰ gesteigert wurde. Das erkaltete braune Schmelzprodukt ließ sich aus Benzol umkristallisieren, lieferte aber kein einheitliches Produkt, sondern ein Gemisch von Platten und Nadeln. — Letztere wurden als Anhydrid I erkannt. — Nach nochmaligem Erhitzen auf 320⁰ erhielten wir dann ein reines, gelb gefärbtes Produkt in schlechter Ausbeute, das bei 347⁰ schmolz.

2) Schwefelschmelze von Anhydrid I bei 300—320⁰ bis zur Beendigung der H₂S-Entwicklung, Ausziehen mit Schwefelkohlenstoff und Umkristallisierung aus Benzol lieferte denselben Körper in noch geringerer Ausbeute.

3) Als gute Methode erwies sich das Erhitzen von Phencyclon mit der berechneten Menge Maleinsäureanhydrid in Nitrobenzol. Der an anderer Stelle erwähnte Umsatz des Ketons mit diesem Lösungsmittel ist hier nicht zu befürchten, da das Anhydrid I schon bei Temperaturen unter 100⁰ sehr bald gebildet wird, während das Pyrrolderivat erst nach längerem Erhitzen entsteht. — Das zunächst entstehende Anhydrid I löst sich bei weiterem Erhitzen, während die Lösung keine dunklere Farbe annimmt. Nach längerem Er-

hißen — die Dauer hängt natürlich von der angesetzten Menge ab (3 g Phencyclon mußten z. B. 10 Stunden gekocht werden) — läßt man erhalten, versetzt mit viel Methylalkohol und filtriert nach einigem Abfützen. Das zunächst noch schwach grün gefärbte Rohprodukt wird, besonders bei größeren Mengen, zweckmäßig in einem Extraktor (Soxhlet) mit Benzol ausgezogen, wodurch man ein gelbes Produkt vom Smp. $348-350^{\circ}$ in schönen quadratischen Plättchen erhält.

Mit conc. Schwefelsäure zeigt sich nach längerem Stehen oder schwachem Erwärmen eine geringe Rotfärbung, die mit der Zeit intensiver wird.

Ausbeute: bis zu 90%.

A n a l y s e:


4,893 mg Subst.: 15,345 mg CO_2 , 1,780 mg H_2O

Gef.: 85,53% C 4,07% H

Ber.: $\text{C}_{32}\text{H}_{18}\text{O}_3$ 85,30% C 4,05% H.

Es ist anzunehmen, daß bei dieser letzten Methode das Zwischenprodukt, das Diphenyl-biphenylen - d i h y d r o - p h t a l - säureanhydrid gebildet wird, doch konnte es trotz mehrerer Proben bei verschiedenen Ansätzen nie gefaßt werden.

3,6-Diphenyl-4,5-(o,o'-biphenylen)-phtalsäure.



2 g Diphenyl-biphenylen-phthal Säureanhydrid wurden in der nötigen Menge alkoholischen Alkalis durch Erhitzen gelöst. Durch Zugabe von conc. HCl zu der siedenden Lösung konnte die Säure in farblosen Flocken ausgefällt werden, die nach dem Erkalten durch gründliches Waschen mit heißem Wasser von dem anhaftenden Alkalichlorid befreit wurden. Nach dem Trocknen wurde in Benzol aufgenommen. Beim Erkalten schieden sich schwach gelbe, grobe Kristalle ab, die beim Erhitzen auf $330-335^{\circ}$ zu zerfließen beginnen, indem sich die Säure zum Anhydrid dehydratisiert.

Mit conc. Schwefelsäure tritt in Gegensatz zum Anhydrid sofort eine Rotfärbung ein, die bei längerem Stehen intensiver wird.

Die Säure ist in Alkali + wenig Alkohol leicht löslich und kann mit Mineralsäuren — nicht mit Wasser — wieder ausgefällt werden.


Anal y s e:

0,1342 g Subst.: 0,4027 g CO_2 , 0,0516 g H_2O

Gef.: 81,84% C 4,302% H

Ber.: $\text{C}_{32}\text{H}_{20}\text{O}_4$ 82,02% C 4,31% H.

3,6-Diphenyl-4,5-(o,o'-biphenylen-)phthalanilid.



Die Darstellung gelingt sehr gut durch Erhitzen des Anhydrids in der doppelten Menge Anilin bis zur klaren Lösung. Wird dann das überschüssige Amin abdestilliert, so scheidet sich beim Erkalten ein gelber Körper ab. Zur völligen Abscheidung versetzt man mit viel Methanol und läßt einige Stunden stehen. Nach dem Filtrieren und Waschen mit Methylalkohol wird getrocknet und aus Benzol umkristallisiert, wodurch man ein gelbes bei 358° schmelzendes Produkt erhält, das mit conc. H_2SO_4 eine Rotfärbung gibt. Ausbeute 95% .

Analysis:


4,776 mg Subst.: 15,230 mg CO_2 , 1,92 mg H_2O

3,452 mg Subst.: 0,086 ccm N_2 ($767/24$)

Gef.: 86,97% C, 4,49% H, 2,88% N

Ber.: $\text{C}_{38}\text{H}_{23}\text{O}_2\text{N}$ 86,83% C, 4,41% H, 2,67% N.

3,6- Diphenyl-4,5-(o,o'-biphenylen-)phthaläuretoluidid.



2 g Diphenyl-biphenylen-phthaläureanhydrid wurden mit 5 g p-Toluidin im Ölbad unter Rückfluß erhitzt und so lange am Sieden (Sdp. 218°) gehalten, bis eine Lösung vorlag. Der Überschuß an Amin ist nötig, da sich das Anhydrid nur sehr schwer löst. Nach dem Erkalten der tiefbraunen Lösung wurde die

entstandene feste Masse pulverisiert, zur Entfernung des überschüssigen Toluidins mit Alkohol aufgekocht und heiß filtriert, und der Rückstand aus viel Benzol oder Toluol umkristallisiert. Die erhaltenen kleinen Kristalle sind von schwach gelber Farbe und schmelzen bei 341° unter Braunfärbung.

Das Produkt zeigt eine schwach rötliche Halochromie, die beim Stehen tiefer wird.


N_2 -Bestimmung:

2,810 mg Subst.: 0,069 ccm N_2 ($748/25,5$)

Gef.: 2,75% N

Ber.: $C_{39}H_{25}O_2N$ 2,60% N.

Kondensation von Diphenyl-biphenylen-phthal säure- anhydrid mit p-Amino-dimethylanilin.



Erhitzt man 2 g des Anhydrids III mit derselben Menge Amin unter CO_2 -Atmosphäre zum Sieden, so erhält man eine rote Schmelze, die beim Erkalten in einen dicken Brei übergeht. Dieser wird zur Entfernung überschüssigenamins mit Alkohol aufgekocht. In der Hitze filtriert, bleibt ein gelber Rückstand, der aus Benzol umkristallisiert, schön ausgebildete gelbe Nadeln lie-

fert, die bei 332° unter Rotfärbung schmelzen. Nach nochmaligem Umkrystallisieren steigt der Smp. auf 338° ; eine Gasentwicklung ist beim Schmelzen nicht zu erkennen. Die gelben Nadeln zeigen mit Schwefelsäure eine tiefrote Halochromie.

Ausbeute: 82 g.

Anal y s e:


0,1632 g Subst.: 7,3 ccm N ($^{758}_{24}$)

Gef.: 5,13% N

Ber.: $C_{40}H_{28}O_2N_2$ 4,93% N

Das Produkt ist wesentlich tieferfarbig als das entsprechende Anilid.

Kondensation von Diphenyl-biphenylen-phthaläure-anhydrid mit Benzidin.



2 g Anhydrid III werden mit 1 g Benzidin gut gemischt und in einem Kölbchen im Salzbad unter Einleiten von CO_2 erhitzt. Bei 240° beginnt eine Reaktion, ohne daß ein ausgeprochenes Schmelzen zu beobachten ist. Es ist ein Zusammen-Sintern, nur kenntlich an einer langsam von außen nach innen

fortschreitenden Grünfärbung der ungeschmolzenen Masse. Bei 270° , nach ca. 20 Minuten, ist keine Reaktion mehr zu erkennen. Es wurde nun unter ständigem Umrühren der pulverigen Masse auf 350° erhitzt, ohne daß noch irgendeine Veränderung eingetreten wäre. — Man pulverisiert das gelb-grüne Produkt, kocht mit Alkohol aus und nimmt nach dem Trocknen in viel Benzol auf. Nach einigen Stunden scheidet sich ein gelb-grüner Körper ab, dessen Schmelzpunkt nach zweimaligem Umkristallisieren bei $360-361^{\circ}$ konstant bleibt.

Mit conc. H_2SO_4 tritt beim Stehen eine Rotfärbung ein.


Stickstoff-Bestimmung:

0,1927 g Subst.: 8,1 ccm N ($^{756}_{128}$)

Gef.: 4,82% N

Ber.: $\text{C}_{44}\text{H}_{28}\text{O}_2\text{N}_2$ 4,55% N.

Kondensation von Diphenyl-o,o'-biphenylen-phthaläure-anhydrid mit o-Phenylen-diamin.



Man mischt 3 g des Anhydrids III mit 1 g Phenylendiamin und erhitzt das Gemisch in einem Kölbchen in CO_2 -Atmosphäre. Da das Amin leicht sublimiert, muß das Gefäß mit einem Steigrohr versehen sein. Zwischen 300 und 310° beginnt die Reak-

tion, wobei eine starke Wasserdampfentwicklung sowie Braunfärbung zu beobachten ist. Die entstandene Schmelze wird noch 10 Minuten auf 350° erhitzt, dann läßt man erkalten, pulverisiert den braunen Kuchen und kocht zur Entfernung eventuell noch vorhandenen Amins mit Alkohol aus. Aus Benzol erhält man ein leuchtend gelbes Produkt vom Smp. 312° .

Mit conc. Schwefelsäure gibt der Körper eine hellrote Halochromie, die beim Erwärmen etwas tiefer wird. Gießt man die rote Lösung in Wasser, so scheidet sich das ursprüngliche Produkt in gelben Flocken ab.

Ausbeute nahezu quantitativ.

Stickstoffbestimmung:


0,1281 g Subst.: 8,4 ccm N ($754/24$)

Gef.: 5,25% N

Ber.: $C_{38}H_{22}ON_2$ 5,56% N.

3,6-Diphenyl-4,5-(o,o'-biphenylen)-phtaloperinon ¹⁾

durch Kondensation von Diphenyl-biphenylen-phtal säureanhydrid mit 1,8-Naphtylen-diamin.



¹⁾ P. Sachs, Ann. 365, 53 ff. (1909).

Zur Darstellung des Perinons werden die beiden Komponenten gemischt und unter Einleiten von CO_2 im Salzbad zum Schmelzen erhitzt, das bei 250° beginnt. Das Kölbchen ist mit einem doppelt durchbohrten Korken versehen, der in der einen Öffnung das CO_2 -Zuleitungsrohr, in der anderen den kurzen Schenkel (2—3 cm) eines nach unten abgebogenen Knierohrs hält. Beim Schmelzen entweicht H_2O , das sich in dem äußeren Teil des Knierohrs kondensiert und von da abgeleitet werden kann. Zwischen 270 und 280° hört die Wasserabspaltung auf und die tiefrote Schmelze erstarrt zu einer festen Masse, die dann beim Weitererhitzen zwischen 300 und 320° wieder flüssig wird. Nach 15 Minuten läßt man erkalten, pulverisiert die rote Masse und schüttelt kurz mit Alkohol, um das überschüssige Amin zu entfernen. Der rote Rückstand wird in Benzol aufgenommen. Beim Erkalten scheidet sich ein schön kristallines, rotes Produkt ab, das bei 319° schmilzt.

Mit conc. H_2SO_4 tritt Rotfärbung ein; verdünnt man die Lösung mit Wasser, so scheiden sich rote Flocken ab.

Ausbeute: fast quantitativ.

Erhitzt man zu hoch und zu rasch, so wird die Ausbeute auf Grund starker Schmierbildung erheblich verringert.

Anal y se:


5,159 mg Subst.:	16,625 mg CO_2 ,	2,050 mg H_2O
3,333 mg „	0,140 ccm N_2 ($^{767}/_{24}$)	
Gef.:	87,88% C,	4,44% H_2 , 4,87% N_2 .
Ber.: $\text{C}_{42}\text{H}_{24}\text{ON}_2$	88,08% C,	4,23% H_2 , 4,89% N_2 .

Analog der Angabe von F. Sachs gelang es, ein bei der Darstellung des beschriebenen Perinons auftretendes Zwischenprodukt zu isolieren. Es bildet sich in 100%iger Ausbeute, wenn man die beiden Reaktionspartner bis zur Beendigung der Wasserdampfentwicklung unter 150° hält. Diese Temperatur darf nicht überschritten werden, da dann die H_2O -Abspaltung weitergeht und das Perinon gebildet wird.

Eine bessere Methode ist die, Anhydrid und Amin getrennt in heißem Toluol zu lösen, die Lösungen dann zusammen zu gießen und im Vakuum erkalten zu lassen. Man erhält so ein orangefarbenes Produkt, das, aus Benzol umkristallisiert, in kleinen Kriställchen rein erhalten wird. Es zeigt keinen Schmelzpunkt, sondern geht beim Erwärmen unter Wasserabspaltung und Dunkelfärbung in das Perinon über.


Eine Probe des orangefarbenen Produktes wurde 10 Stunden auf 200° erhitzt, wobei es genau 1 Mol. Wasser verlor unter Bildung des Perinons. Dieselbe Umwandlung trat durch 15-stündiges Erhitzen in o-Dichlorbenzol ein. Ebenso scheint conc. Schwefelsäure zu wirken, mit dem es die dem Perinon eigene Halochromie zeigte. Umgekehrt ließ sich das Perinon durch längeres Erhitzen mit verd. HCl in das hellere Produkt überführen.

Es handelt sich bei dem orangefarbenen Produkt um die 3,6-Diphenyl-4,5-biphenylen-2-Perimidyl-o-benzoesäure, die sich von dem aus 1,8-Naphtylendiamin + Ameisensäure erhaltenen Perimidin



ableitet.

Wird die Perimidylbenzoesäure weitererhitzt, so spaltet die Carboxylgruppe mit dem Imidwasserstoff H_2O ab und geht unter Bildung eines 5-Ringes in das Perinon über, das als Lactam der Monocarbonsäure angesehen werden kann. Umgekehrt wird aus diesem durch Wasseraufnahme die Säure zurückgehalten:




Die Perimidylbenzoë Säure ist bei der Schmelze kaum zu erhalten, da dabei sofort 2 Moleküle Wasser abgespalten werden, während die oben angeführte zweite Methode selbst nur zu einer einseitigen Abspaltung führt.

Die Säure löst sich nur sehr schwer in Alkali, auch nach Zusatz von Alkohol erst nach längerem Erhitzen.

Nach diesen Ergebnissen wurde versucht, denselben Umsatz in der Reihe des Endocarbonyl-diphenyl-biphenylen-dihydrophthal Säureanhydrids durchzuführen, indem die beiden Komponenten getrennt in Alkohol bzw. Toluol gelöst wurden. Es gelang aber nicht, das entsprechende Perinon oder die Perimidylbenzoë Säure zu fassen.

Phenyl-o,o'-biphenylen-fluorenon-carbon-säure.



Zur Darstellung dieser Verbindung löst man das Diphenyl-biphenylen-phthal Säureanhydrid in Benzol, gibt zur Lösung 6 Mol AlCl_3 und erhitzt noch 20 Minuten unter Rückfluß auf dem Wasserbad. Dabei nimmt die Lösung eine violett-rote Farbe an. Man gießt in Wasser, vertreibt das Benzol durch Wasserdampfdestillation, filtriert und kocht den orangeroten Rückstand — die violette Färbung verschwindet bei der Destillation — zur Entfernung von $\text{Al}(\text{OH})_3$ mit verd. HCl aus. Nach gründlichem Waschen mit heißem Wasser wird getrocknet und in Benzol aufgenommen. Beim Erkalten scheiden sich gut ausgebildete orangefarbene Rhomboeder vom Smp. 312° ab.

Mit conc. Schwefelsäure tritt eine Violettfärbung ein, die sehr bald in Weinrot übergeht.

Das Produkt löst sich in heißem Alkohol mit orange-gelber Farbe.

Ausbeute: 70%.

Anal y s e:

0,097 g Subst.:	0,304 g CO_2 ,	0,0368 g H_2O
Gef.:	85,47 % C	4,25 % H
Ber.: $\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{O}_3$	85,31 „	4,03 „

Ein Versuch mit nur 3 Mol. AlCl_3 gab zunächst eine rotbraune Lösung, die bei der Wasserdampfdestillation wesentlich heller wurde

und schließlich zu einem gelben Rückstand führte. Dieser wurde, wie oben angegeben, gereinigt und aus Benzol umkristallisiert, worauf er den Smp. 349⁰ zeigte. Eine Mischschmelzpunktsprobe mit Diphenyl-biphenylen-phthal Säureanhydrid zeigte keine Depression; es hatte also keine Veränderung stattgefunden. Die vorübergehende Braunfärbung muß auf eine Anlagerung von AlCl_3 an das Anhydrid zurückgeführt werden.

Darstellung des o,o'-Biphenylen-difluorenon.



1) Analog zur Darstellung der Fluorenoncarbonsäure wurde hier das Diphenyl-biphenylen-phthal Säureanhydrid mit 12 Mol. AlCl_3 in Benzol erhitzt. Nach 1-stündigem Sieden schied sich ein rotbraunes Produkt ab, das mit Wasser sofort eine orangerote bis gelbe Farbe annahm. Daraufhin wurde ein zweiter Teil des rotbraunen Körpers ohne vorherige Zugabe von Wasser sofort filtriert, doch trat auch hier, scheinbar durch die Einwirkung der Luftfeuchtigkeit, sehr bald die Farbaufhellung ein. In beiden Fällen lag ein Gemisch eines roten und eines gelben Stoffes, letzterer als Hauptmenge, vor. Nach mechanischer Trennung (Auslesen unter der Lupe) konnten mit einiger Sicherheit die Schmelzpunkte bestimmt werden, die für den roten Körper bei 312 und für den gelben bei 349⁰ gefunden wurden. Es hatte sich also, wahrscheinlich über eine Anlagerungsverbindung von AlCl_3 an

Diphenyl-biphenylen-phthal Säureanhydrid, dieses unter der Einwirkung von Wasser wieder zurückgebildet; daneben blieb eine geringe Menge der Fluorenoncarbon Säure, während Difluorenon überhaupt nicht entstanden war.

2) In einem zweiten Versuch wurde in eine Schmelze von 2 g AlCl_3 + 2 g NaCl 2 g Diphenyl-biphenylen-phthal Säureanhydrid in kleinen Portionen eingetragen, bis schließlich eine schwarzbraune feste Masse vorlag, die nach dem Pulverisieren mit HCl ausgekocht und anschließend gut mit Wasser gewaschen wurde. Das nun braun gefärbte Produkt erwies sich als sehr schwer löslich. Es konnte in viel Chlorbenzol aufgenommen werden; nach starkem Einengen fiel ein tiefroter Körper aus von Smp. 321° .


Die Ausbeute ist sehr schlecht; aus 2 g Anhydrid wurden 0,6 g des tiefroten Produktes erhalten, das sich aber als noch nicht rein erwies.

Verfuch zur Darstellung des 1,4-Diphenyl-5,6-(o,o'-biphenylen)-benzols aus Phencyclon und Acetylen

1) Durch Einleiten von Acetylen in eine Schmelz von Phencyclon erhielten wir ein braunes Produkt, aus dem kein einheitlicher Körper isoliert werden konnte. Reinigungsversuche mit Benzol, Toluol, Chlorbenzol, Nitrobenzol, Acetanhydrid u. a. lieferten entweder das braune Rohprodukt in kaum veränderter Form, oder braune Schmier. Es muß angenommen werden, daß das Keton bei dieser Temperatur zersetzt wird, bevor das Acetylen zur Einwirkung kommt.

2) Nach 2-tägigem Einleiten von Acetylen in eine Lösung von Phencyclon in Chlorbenzol waren neben viel Keton Spuren eines fast farblosen Körpers zu erkennen, die allerdings nicht rein erhalten werden konnten. Weitere Versuche konnten aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden, doch ist anzunehmen, daß ein höher siedendes Lösungsmittel und hinreichende Einwirkungsdauer hier zum Ziele führen.

1,2,4-Triphenyl-5,6-biphenyl-benzol
 durch Addition von Phenylacetylen ¹⁾ an Phencyclon.



3 g Phencyclon werden mit 2 g Phenylacetylen in einem Kölbchen mit Steigrohr im Ölbad erhitzt. Bei 100° beginnt die Reaktion, kenntlich an einer starken CO-Entwicklung, die auch nach dem Herausnehmen aus dem Ölbad ohne weitere Wärmezufuhr bis zur Beendigung des Umsatzes anhält. Aus der entstandenen gelb-roten Lösung scheiden sich beim Erkalten Kristalle ab, die durch noch anhaftendes Phenylacetylen schwach gelb gefärbt sind. Der Schmelzpunkt des Rohproduktes liegt zwischen 245 und 248°. — Zur Reinigung wurde im vorliegenden Falle einmal aus Chlorbenzol und daraufhin zweimal aus Acetanhydrid umkristallisiert. Wir erhielten so ein farbloses Produkt in langen Nadeln, die bei 250° ohne Zersetzung schmelzen.

Der Körper ist in conc. H₂SO₄ unlöslich; erst beim Erhitzen tritt rote Färbung ein.

Ausbeute: 2,7 g.

A n a l y s e:

0,1079 g Subst.:	0,3743 g CO ₂ ,	0,0511 g H ₂ O
Gef.:	94,61% C,	5,30% H
Ber.: C ₃₆ H ₂₄	94,70% C.	5,30% H.

¹⁾ J. C. Hessler, Journ. Am. Soc. 44, 425 (1922).

Versuch zur Darstellung des 1,4-Endocarbonyl-1,2,4-triphenyl-5,6-biphenyl-benzols.

Wir versuchten zunächst, diesen Körper durch Erhitzen von 2 g Phencyclon und 2 g Phenylacetylen in 25 ccm Benzol zu erhalten. Nach ca. 1-stündigem Sieden lag eine klare, gelbe Lösung vor, die auf die Hälfte eingeeengt wurde. Beim Erkalten schied sich ein gelbes Produkt ab, bis schließlich ein dicker Brei entstanden war, der mit Methanol verrührt wurde. Nach einigem Stehen wurde filtriert und gut mit CH_3OH gewaschen. Das nun fast farblose Rohprodukt zeigte bereits den Smp. 247^0 ; eine Gasentwicklung war beim Schmelzen nicht zu beobachten. Verschiedene Proben, aus Chlorbenzol oder Benzol umkristallisiert, schmolzen bei 250^0 und zeigten mit dem vorher erwähnten Produkt (250) keine Schmelzpunktdepression. Es war also Triphenyl-biphenylbenzol entstanden.

Ausbeute: 2,25 g = 94%.

Hinsichtlich der Ausbeute und der Reinheit des Endproduktes ist diese Methode der vorher beschriebenen vorzuziehen.


Anschließend wurde versucht, die Endocarbonylverbindung durch Schütteln der beiden Komponenten bei Zimmertemperatur darzustellen. Nach 10 Stunden war die Umsetzung beendet. Auch hier wurde nach dem Reinigen aus Benzol der bei 250^0 schmelzende Körper erhalten.

Schließlich zeigte sich, daß das Phencyclon mit Phenylacetylen bei ruhigem Stehen in Zimmertemperatur (innerhalb von 3 Tagen) unter Bildung des bekannten Produktes 250 reagiert.

Die gesuchte Endocarbonylverbindung scheint also nicht darstellbar zu sein, da sich auch bei den mildesten Bedingungen das carbonylfreie Triphenyl-biphenylbenzol bildet.

1,2,3,4-Tetraphenyl-5,6-(o,o'-biphenylen)-benzol ¹⁾

durch Addition von Tolan an Phencyclon.



Man erhitzt Phencyclon mit Tolan im Verhältnis 1:1 im Ölbad auf 180° und hält diese Temperatur, bis die Gasentwicklung (CO) beendet ist. — Im Salzbad ist dies bei 230° nach 5 Minuten der Fall. — Die anfänglich grüne Schmelze färbt sich dabei allmählich rot. Der erhaltene rote Sirup wird in wenig heißem Benzol aufgenommen. Beim Erkalten scheidet sich hier oft eine geringe Menge eines schwach gelb gefärbten Produktes ab, das nach seinem Smp. von $310\text{—}312^{\circ}$ und seinem Verhalten (Oxydierbarkeit zum Phencyclon, in Pyridin durch Na-Alkoholat Orangefärbung) als Dihydrophencyclon (Smp. 314) angesprochen wurde. Man filtriert und versetzt das Filtrat vorsichtig mit Methylalkohol, wodurch ein fast farbloses Produkt abgetrennt wird, das zwischen 285 und 290° schmilzt. Nach zweimaligem Umfällen aus Benzol-Methanol liegt der Smp. konstant bei $292\text{—}293^{\circ}$. Beim Schmelzen tritt keine Zersetzung ein.

Die Kristallnadeln zeigen mit conc. H_2SO_4 keine Halochromie.

Das Ausfällen mit Methylalkohol muß vorsichtig geschehen, da man sonst sehr leicht Schmierer erhält.

¹⁾ E. Söderbäck, A. 443, 161 (1925).

Ä n a l y s e:

4,928 mg Subst.:	17,035 mg CO ₂ ,	2,450 mg H ₂ O
Gef.:	94,30% C	5,56% H
Ber.: C ₄₂ H ₂₈	94,70% C	5,30% H

M o l e k u l a r g e w i c h t s b e s t i m m u n g
des Tetraphenyl-biphenylen-benzols durch Schmelzpunktsdepression in Kampher (Raft):

C = Menge Kampher	= 0,2458 g
c = Menge Substanz	= 0,0211 g
d = Depression	= 1) 6,6° 2) 6,2°

$$M = \frac{40 \cdot c \cdot 1000}{C \cdot d}$$

= 1)	520	Ber.:	532.
= 2)	553		

Um die Frage nach der Konstitution des Tetraphenyl-biphenylen-benzols zu klären, wurde eine Nitrierung dieses Produktes versucht, um dann die NO₂-Gruppen zu bestimmen. Bei verschiedenen Versuchen, bei denen das Tetraphenyl-biphenylen-benzol in rauchende HNO₃ eingetragen wurde, konnte weder in der Hitze noch bei 0° ein reines Produkt erhalten werden.

Versuch zur Darstellung von 1,2,3,4-Tetraphenyl-5,6-biphenylenbenzol aus Tetraphenyl-cyclopentadienon und Phenanthren.

Die Bildung des Tetraphenyl-biphenylen-benzols aus Diphenyl-biphenylen-cyclopentadienon (Phencyclon) + Tolan ließ den Gedanken aufkommen, dieses aus Tetraphenyl-cyclopentadienon (Tetracyclon) + Phenanthren aufzubauen.

a) 2 g Tetracyclon wurden mit 2 g Phenanthren im Salzbad erhitzt. Bei 210° begann das Schmelzen zu einer violett-roten Masse, die sich auch beim Weitererhitzen bis auf 300° nicht mehr veränderte. Auch eine Gasentwicklung war nicht zu beobachten! Nach dem Erkalten wurde die nun feste Masse pulverisiert, in

heißem Benzol aufgenommen und die Lösung stark eingeengt. Es schied sich zunächst ein dunkelrotes Produkt ab, später ein Gemisch, schließlich ein farbloser Körper. Es war der Reihe nach Tetracyclon, Tetracyclon + Phenanthren und Phenanthren.

Ein Versuch mit 3 g Keton und 10 g Phenanthren führte zu dem gleichen Resultat.

b) Nun wurden 5 g des roten Ketons mit 7,5 g Phenanthren — das entspricht einem Mol-Verhältnis 1:3 — im geschlossenen Rohr im Bombenofen 6 Stunden lang auf 280—300° gehalten. Beim Öffnen des Rohres war kein Überdruck zu bemerken! Die erhaltene rote Masse wurde in Benzol aufgenommen, die Lösung wieder eingeengt und erkalten gelassen. Auch hier schied sich zunächst Tetracyclon ab, dann in der Hauptmenge das Gemisch Keton-Phenanthren und zuletzt noch geringe Mengen reinen Phenanthrens. Das Keton-Phenanthren-Gemisch ließ sich mittels Methylalkohols trennen, da sich das Phenanthren in diesem Lösungsmittel leichter löst und aus ihm in Form schwach gelber Blättchen zurückgewonnen werden kann.

c) Ausgehend von der Überlegung, daß dehydrierende Mittel hier katalytisch wirken könnten, wurden 5 g Tetracyclon mit 2,5 g Phenanthren in 20 ccm Nitrobenzol unter Rückfluß zum Sieden erhitzt. Nach 5 Stunden war eine schwache Änderung der Farbe zu erkennen. Diese Farbänderung ist nur ganz gering von dem violett-rot des Ketons zu einem violettschigen braunrot. Nach weiteren 5 Stunden, während deren der Farbumschlag kaum stärker geworden war, wurde heiß filtriert und erkalten gelassen. Sollten beim Filtrieren Spuren eines Rückstandes auftreten, so kann es sich nur um ungelöste bzw. nicht umgesetzte Ausgangsstoffe handeln. Aus dem Filtrat schieden sich beim Erkalten 0,9 g eines gelben, teilweise kristallinen Produktes ab. Das Filtrat lieferte nach dem Einengen auf die Hälfte und nach Zusatz von CH_3OH noch knapp 1 g eines braunen, amorphen Körpers. Diese geringe Ausbeute konnte durch weiteres Einengen nicht erhöht werden, da sich sehr rasch braune Schmierungen zeigten. Die beiden Ausbeuten wurden vereinigt, in Benzol aufgenommen und diese Lösung mit wenigen Tropfen Ligroin versetzt.


Nach längerem Stehen schied sich ein kristallines Produkt ab, dessen Smp. nach nochmaligem Umfällen konstant bei $283\text{--}284^{\circ}$ lag. Der Körper gibt mit conc. Schwefelsäure eine Gelbfärbung, die nach einigem Stehen tiefer wird und schließlich eine grüne Fluoreszenz zeigt.

Das erhaltene Produkt unterscheidet sich also von dem erwarteten im Schmelzpunkt und in der Halochromie; der Mischsmp. liegt bei $250\text{--}60$.

Durch Versuche mit Phencyclon, die gleichzeitig mit dem oben angeführten gemacht wurden, erkannten wir, daß die Ketone mit Nitrobenzol in Reaktion treten. Das Phencyclon, lieferte nämlich bei den Ansätzen mit Phenanthren und Stilben in Nitrobenzol daselbe Endprodukt, d. h. es reagierte mit dem Lösungsmittel. — Auf diese Versuche mit dem grünen Keton wird an anderer Stelle eingegangen.

Zur Kontrolle wurden 6 g Tetracyclon in 20 cem Nitrobenzol erhitzt, nach 5-stündigem Sieden abfiltriert, auf die Hälfte eingeengt und erkalten gelassen. Es schied sich dabei zunächst nur eine ganz geringe Menge eines kristallinen Produktes ab, die durch vorsichtiges Zugabe von Methanol erhöht werden konnte. Nach dem Umfällen aus Benzol-Ligroin lag der Smp. auch hier bei $283\text{--}284^{\circ}$. — Es handelt sich also in beiden Fällen um ein Reaktionsprodukt des Tetracyclons mit Nitrobenzol!

Dabei besteht die Möglichkeit, daß die Carbonylgruppe nicht als CO, sondern als CO_2 herausgespalten wird. — Ein daraufhin im Stickstoffstrom vorgenommener Versuch zeigte die Richtigkeit dieser Annahme, indem in einer Barytwasser-Vorlage BaCO_3 ausgefällt wurde. Das Reaktionsprodukt konnte schließlich als Pentaphenylpyrrol angesprochen werden.



Anal y se:

5,284 mg Subst.: 17,730 mg CO₂, 2,720 mg H₂O

2,848 mg „ „ 0,088 cm³ N (757/21)

Gef. 91,51% C 5,72% H₂, 3,54% N

Ber.: C₃₄H₂₈N : 91,27% C 5,59% H₂, 3,14% N

Dehydrierung von Tetraphenyl-o,o'-biphenylen-benzol mit AlCl₃.

3 g des Tetraphenylbiphenylenbenzols werden in der nötigen Menge Benzol gelöst und in die Lösung dann 2,5 g AlCl₃ (Molverh. 1:5) in kleinen Mengen eingetragen. Nach wenigen Minuten trat eine Violett färbung ein, die bald in blau überging, während sich gleichzeitig an der Wandung des Gefäßes ein dunkelbraun gefärbtes Produkt abschied. Nach Beendigung der HCl-Entwicklung wurde in Wasser gegossen, das Benzol mit Wasserdampf abgeblasen und die verbleibende braune Substanz zunächst mit HCl und dann mit Wasser ausgekocht. Nach gründlichem Waschen mit heißem Wasser und gutem Trocknen wurde das braune Pulver in Nitrobenzol aufgenommen. Durch Toluol oder Äther ließ sich ein brauner, flockiger Körper ausfällen, der auch aus Nitrobenzol direkt erhalten werden konnte, allerdings in weniger reiner Form.

Weitere Reinigungsversuche mit Nitrobenzol, mit Toluol, Chlorbenzol u. a. waren ohne merklichen Erfolg; außerdem löst sich

das Produkt sehr schwer und läßt sich in nur geringer Ausbeute wieder ausfällen, da bei starkem Einengen Verharzung eintritt. Schließlich gelang es, durch Sublimation im Vakuum (1—2 mm Hg) eine geringe Menge goldgelber bis orangeroter Nadeln zu erhalten, die aber immer noch durch eine dunkelbraune amorphe Substanz verunreinigt waren, sodaß von einer Analyse abgesehen wurde.

Die gelben Nadeln waren bei 450° noch nicht geschmolzen und zeigten in conc. Schwefelsäure keine Halochromie.

Versuch zur Darstellung von Endocarbonyl-tetraphenyl-biphenylen-benzol.

1) Durch Erhitzen von 3 g Phencyclon mit 2 g Tolan in Benzol war nach 20-stündigem Sieden noch keine Reaktion eingetreten, und beim Erkalten schieden sich die beiden Ausgangskomponenten ab.

2) 3 g Phencyclon wurden mit 5 g Tolan in Toluol erhitzt. Nach 12 Stunden war eine geringe Farbänderung zu erkennen, die auch bei weiterem Erhitzen nicht stärker wurde. Nach 20 Stunden wurde erkalten gelassen, wobei sich ein gelbes Produkt absetzte, das durch geringe Mengen nicht umgesetzten Phencyclons verunreinigt war. Nach mehrmaligem Aufnehmen in Toluol lag schließlich ein nahezu farbloses Produkt vor, das bei 203° schmolz.

Mit H_2SO_4 tritt Rotfärbung ein; beim Verdünnen mit Wasser scheiden sich schwach gelbe Flocken ab.

Analysis:

5,158 mg Subst.: 16,420 mg CO_2 , 2,25 mg H_2O

Gef.: 86,82% C 4,88% H

Ber.: $\text{C}_{48}\text{H}_{28}\text{C}$: 92,11% C 5,04% H

Nach den gefundenen Werten scheint es sich um eine sauerstoffreichere Verbindung zu handeln. Die rote Halochromie entspricht ebenfalls nicht der erwarteten Endocarbonylverbindung, die doch, wie z. B. die auf S. 65 beschriebene Endocarbonyl-tri-

phenyl-biphenylen-benzoë Säure, auch die dem Phencyclon eigene tiefgrüne Färbung zeigen müßte.

3) Ein Additionsversuch in Chlorbenzol führte nach 30-stündigem Sieden zu dem schon durch Schmelzen dargestellten Tetraphenyl-biphenylen-benzol vom Smp. 293°.

2,3,6-Triphenyl-4,5-(o,o'-biphenylen)-benzoë Säure
durch Schmelze von Phencyclon mit Phenylpropioisäure.



Man erhitzt Phencyclon mit der gleichen Menge Phenylpropioisäure unter Einleiten von CO_2 im Ölbad, ohne 190° zu überschreiten, da bei dieser Temperatur eine Zersetzung der Phenylpropioisäure unter Bildung von Phenylacetylen und CO_2 erfolgt. Am besten wird bei $150\text{--}170^\circ$ gearbeitet und die Schmelze nach Beendigung der CO -Entwicklung sofort aus dem Bad genommen, da die oben angeführte Spaltung bei längerem Erhitzen auch schon bei tieferen Temperaturen eintritt. Bleibt man unterhalb 150° , so erhält man ein Gemisch der gesuchten Säure mit ihrem Endocarbonylprodukt, das sich in diesem Falle, wie später noch gezeigt wird, sehr leicht bildet.

Nach Beendigung der ziemlich heftigen Gasentwicklung läßt man also die Schmelze möglichst rasch erkalten, pulverisiert die braune gläserne Masse und zieht zur Entfernung nicht umgesetzter Phenylpropioisäure mit Alkohol oder Äther aus. Das Rohpro-

dukt wird dann in Benzol aufgenommen, die Lösung eingeengt und langsam erkalten lassen. Es scheidet sich ein schwach gelb gefärbtes Produkt ab, das bei 308° schmilzt. Nach nochmaligem Umkrystallisieren aus Benzol schmelzen die nun farblosen Nadeln zwischen 314 und 316° . Beim Schmelzen findet keine CO_2 -Abspaltung statt, wodurch Triphenyl-biphenylen-benzol erhalten würde, sondern die Säure schmilzt ohne Zersetzung.

Das Produkt zeigt mit conc. Schwefelsäure eine zunächst schwach violett-rote Färbung, die mit der Zeit intensiver wird und schließlich tiefrot erscheint. Beim Verdünnen mit Wasser scheidet sich ein farbloses Produkt ab.

Die Säure löst sich in Alkali nach Zusatz von wenig Alkohol ziemlich leicht und läßt sich mit Säuren wieder ausfällen:

Anal y se:

I. 5,134 mg Subst.: 16,695 mg CO_2 , 2,390 mg H_2O

Gef.: 88,69% C 5,21% H


II. 5,038 mg Subst.: 16,180 mg CO_2 , 2,180 mg H_2O

Gef.: 87,59% C 4,84% H

Ber.: $\text{C}_{37}\text{H}_{24}\text{O}_2$: 88,76% C 4,84% H

Der zweite Wert für C ist zu tief, da noch geringe Mengen des entsprechenden Endocarbonylproduktes darin enthalten waren. Die Analyse eines bei 140 — 150° dargestellten Produktes lieferte sogar nur 86,80 % C.

Endocarbonyl-triphenyl-biphenylen-benzoëssäure
durch Addition von Phenylpropioläure an Phencyclon.



Im Gegensatz zu Phenylacetylen und Tolan addiert sich die Phenylpropioläure ohne CO-Entbindung sehr leicht an das Phencyclon. Die entstehende Endocarbonylverbindung bildet sich in 100%iger Ausbeute und erweist sich als recht stabil.

Zu ihrer Darstellung wurden 5 g Phencyclon mit 5 g Phenylpropioläure in 30 ccm Benzol unter Rückfluß auf dem Wasserbad erhitzt. Nach 5 Stunden war eine deutliche Farbaufhellung zu erkennen, außerdem hatte sich an der Wandung des Gefäßes eine geringe Menge eines schwach grün gefärbten Produktes abgeschieden. Nach weiteren 3 Stunden wurde erkalten lassen, filtriert und zur Entfernung der überschüssigen Phenylpropioläure mit wenig Alkohol und anschließend mit Benzol umkristallisiert. Die völlige Reinigung wurde durch Umkristallisation aus Aceton durchgeführt.

Das reine, farblose Produkt schmilzt unter starker Gasentwicklung bei 206—208°.

Mit H₂SO₄ tritt sofort eine tiefgrüne Färbung ein, analog der des Phencyclons. Gießt man die Lösung in Wasser, so scheiden sich farblose Flocken ab, die — ungereinigt — zwischen 225 und 230° schmelzen. Es dürfte sich dabei um ein schon früher (Diffler Horst) beschriebenes Hydrat des Phencyclons handeln,

Analyse:

5,090 mg Subst.: 16,050 mg CO₂, 2,100 mg H₂O
 86,00% C 4,62% H

Diese Werte stimmen an sich auf die Endocarbonyl-triphenyl-biphenyl-benzoë Säure C₃₈H₂₄O₃ mit 86,33% C und 4,58% H₂, doch löst sich das erhaltene Produkt nicht in Alkalien, auch nicht auf Zusatz von Alkohol.

Bei weiterer Untersuchung zeigte sich, daß sich der erhaltene Körper unter CO-Abspaltung in die bei 314° schmelzende Triphenylbiphenyl-benzoë Säure überführen läßt, und zwar entweder durch längeres Erhitzen in hochsiedenden Lösungsmitteln, wie o-Dichlorbenzol, oder durch vorsichtiges Schmelzen. Läßt man nämlich die Endocarbonylverbindung langsam durchschmelzen, so tritt neben starker Gasentwicklung — das Gas wurde im Azotometer über 50%iger KOH aufgefangen und als CO erkannt — zunächst die Grünfärbung ein, die aber bald in braun übergeht, während die Schmelze wieder erstarrt. Dieses erstarrte Produkt zeigt dann nicht mehr die grüne Halochromie, sondern eine violett-rote und schmilzt nach 2-maligem Umkrystallisieren aus Benzol ohne Zersetzung bei 314°.

CO-Bestimmung:

Subst: 0,2903 g Gef.: 12,1 cm³ CO
 Ber.: 12,4 cm³ CO.

Darstellung eines Körpers aus Phencyclon und Anilin.

Erhitzt man 2 g Phencyclon mit 10 ccm Anilin langsam auf 150°, so erhält man eine zunächst noch grüne, dann rasch hellbraun werdende klare Lösung, aus der sich beim Erkalten ein schwach gelb gefärbtes Produkt abscheidet, dessen Ausbeute durch Zusatz von Methanol erhöht werden kann. Insgesamt werden 2,5 g des flockigen Rohprodukts erhalten, das zwischen 225 und 230° unter Gasentwicklung und Grünfärbung schmilzt.

Nimmt man in Benzol, dem einige Tropfen Anilin zugesetzt sind auf, so scheidet sich beim Erkalten ein farbloses Produkt in

schönen Nadeln vom Smp. 233—234⁰ ab. Beim Schmelzen ist starke Gasentwicklung zu beobachten, außerdem eine Grünfärbung, die aber bald in Braun übergeht.

Mit conc. Schwefelsäure tritt sofort Grünfärbung ein.

Analysis:

0,1564 g Subst.: 0,5062 g CO₂, 0,0963 g H₂O

0,1968 g Subst.: 5,7 ccm N₂ (⁷⁵⁰/₂₂)

0,1533 g Subst.: 4,3 ccm N₂ (⁷⁵²/₂₂)

Gef.: 88,27% C, 4,96% H, 3,28% N
3,19% N

Es handelt sich hier wahrscheinlich um ein Additionsprodukt von Anilin an Phencyclon mit der Summenformel C₃₅H₂₅ON, für welches berechnet werden:

88,38% C, 5,20% H, 2,95% N.

Versuch der Addition von Monomethylanilin an Phencyclon.

3 g Phencyclon wurden mit 10 ccm frisch destilliertem Monomethylanilin zum gelinden Sieden erhitzt. Nach ca. 20 Minuten trat ein Farbumschlag von Grün nach Dunkelbraun ein, der sich bei weiterem Erhitzen (10 Minuten) nicht mehr änderte. Beim Erkalten schied sich eine gelbe, flockige Masse ab, die filtriert und gut mit Methylalkohol und Äther gewaschen wurde. Dabei schied sich aus dem Filtrat noch eine kleine Menge des Produktes ab. Nach dem Trocknen wurde ein Teil aus Benzol, ein anderer aus Toluol umkrystallisiert. In beiden Fällen konnten bei 310⁰ schmelzende, farblose Nadeln erhalten werden. Durch nochmaliges Aufnehmen in Benzol und Ausfällen mit Petroläther stieg der Schmelzpunkt auf 313⁰.

Mit conc. Schwefelsäure tritt erst beim Erwärmen eine blaue Halochromie ein, die bald in Braun übergeht.

Analysis:

0,02240 g Subst.: 0,07469 g CO₂, 0,01144 g H₂O

Gef. 90,94% C 5,57% H

Stickstoffbestimmung: negativ.

Nach diesen Werten, dem Schmelzpunkt und der Halochromie handelt es sich um das Dihydrophencyclon $C_{29}H_{20}O$ mit 90,59 % C und 5,25 % H. Diese Annahme findet ihre Bestätigung in der Mischschmelzpunktprobe, die keine Depression erkennen läßt.

Versuch der Addition von Dimethylanilin an Phencyclon.

Ebenso wie mit Anilin und Monomethylanilin wurde nun ein Umfaß des Ketons mit Dimethylanilin versucht. Letzteres war zu diesem Zweck destilliert und mittels Acetanhydrid sorgfältigst auf die Abwesenheit von Monomethylanilin geprüft worden. Nach 15 Minuten gelinden Siedens schlug die Farbe sehr rasch von Grün nach orangegelb um, worauf das Erhitzen der vollständig klaren Lösung abgebrochen wurde. Beim Erkalten schied sich ein schwach gelbes flockiges Produkt ab, das abfiltriert und so lange mit Äther gewaschen wurde, bis der Amingeruch und die gelbe Farbe verschwunden waren. Nach dem Trocknen im Vakuum bei Zimmertemperatur schmolz das Rohprodukt zwischen 285 und 300°; mit H_2SO_4 zeigte es erst beim Erhitzen eine blaugrüne Färbung, die rasch in Braun überging.

Zur Reinigung wurde in viel frisch destilliertem Toluol aufgenommen, die Lösung etwas eingengt und erkalten gelassen. Die abgeschiedenen farblosen Nadeln schmolzen zwischen 308 und 310° unter vorherigem Braunwerden und gaben erst beim Erwärmen blaugrüne Halochromie. Der Mischmp. mit Dihydrophencyclon zeigte keine Depression.

Aus der Mutterlauge schied sich, scheinbar infolge des beim Waschen zugesetzten Äthers, nach 2-tägigem Stehen ein gelber Körper ab, der ebenfalls mit Äther gewaschen und bei Zimmertemperatur getrocknet wurde. Im Gegensatz zu dem obigen Produkt behielt dieses beim Waschen seine gelbe Farbe, zeigte mit Schwefelsäure schon in der Kälte eine schwache Grünfärbung und schmolz zwischen 220 und 230°. Die Substanz wurde in wenig frisch destilliertem Toluol von 45–50° aufgenommen, die Lösung von einem geringen Rückstand — Spuren des oben

beschriebenen Körpers — abfiltriert und mit der 2—3fachen Menge Petroläther versetzt. Schon nach kurzer Zeit schied sich ein fast farbloses Produkt ab, das sich oberhalb 225° zersetzte.

Mit conc. Schwefelsäure tritt eine schwache Grünfärbung ein.

Stickstoff-Bestimmung:

3,059 mg Subst.: 0,087 ccm N_2 ($^{753}/_{24,5}$)

Gef.: 2,78% N .

Für die Additionsverbindung aus Phencyclon + Dimethylanilin $C_{37}H_{29}ON$ werden 2,79 % N berechnet.

Versuch der Addition von p-Chloranilin an Phencyclon.

3 g Phencyclon wurden mit 5 g p-Chloranilin, das als Lösungsmittel diente, in einem Kölbchen unter CO_2 -Atmosphäre auf $160—170^{\circ}$ erhitzt. Nach ca. 2 Stunden war die Farbe von grün in braun übergegangen. Beim Erkalten scheiden sich gelbe Flocken ab, und schließlich lag ein dicker Brei vor, der zur völligen Ausfällung und zur Reinigung mit Methylalkohol verrührt wurde. Letzteres verhindert außerdem ein „Verölen“ der braunen Masse. Nach dem Filtrieren, gründlichem Waschen mit Alkohol und Äther wurde das nun gelb gefärbte Produkt in heißem Benzol aufgenommen, die Lösung erkalten gelassen und mit wenig Ligroin bzw. Petroläther versetzt. Nach einigem Stehen fielen farblose, seidig glänzende Nadelchen aus vom Smp. 313° .

Das Produkt zeigt in der Kälte mit conc. Schwefelsäure keine Halochromie; bei gelindem Erwärmen tritt eine Blaufärbung ein, die bald in Braun übergeht.

CH-Bestimmung:

4,706 mg Subst.: 15,565 mg CO_2 , 2,170 mg H_2O

Gef.: 90,21% C 5,16% H

Stickstoff konnte nicht nachgewiesen werden. Eine Mischprobe mit Dihydrophencyclon, für das 90,59 % C und 5,25 % H berechnet werden, zeigte keine Schmelzpunktdepression,

Ein Additionsversuch mit m- und o-Chloranilin,

nach dem gleichen Verfahren wie oben durchgeführt, lieferte in beiden Fällen ebenfalls Dihydrophencyclon.

Analyse mit m-Chloranilin: 90,34 % C, 5,32 % H. Smp. 312°.


Mit conc. Schwefelsäure tritt beim Erwärmen die oben erwähnte Blaufärbung ein.

Das bei 314° schmelzende Dihydrophencyclon wurde ferner erhalten aus:

Phencyclon und	Dauer d. Erh.	Veränderung	Bemerkungen
Phenol	15 Minuten Sieden	Aufhellung	mit CH ₃ OH gefällt
Phenylsenöl	6 Stunden Sieden	geringe Aufhellung	Fällung mit CH ₃ OH
Pyridin	15 Min. 150°	Lösung	Beim Erhitzen N ₂ -Entwicklung
Phenylhydrazin	15 Min. 150°	Lösung	Beim Erhitzen N ₂ -Entwicklung
Diäthylamin und Triäthylamin	10 Min. i. sied. Chlorbenzol	Aufhellung	mit CH ₃ OH gef.
Benzylcyanid	30 Min. 200°	Aufhellung	
Benzalanilin	30 Min. 300°	Aufhellung	geringe Ausbeute

1,2,5-Triphenyl-3,4-o,o'-biphenylen-pyrrol.

Bei Versuchen, Phencyclon mit Phenanthren bzw. Stilben durch Erhitzen in Nitrobenzol zur Reaktion zu bringen, stellten wir fest, daß das Keton mit dem gewählten Lösungsmittel reagiert unter Bildung von Triphenyl-biphenylen-pyrrol:



Aus 5 g Phencyclon und 20 ccm Nitrobenzol erhielten wir nach 5-stündigem Sieden, während dem das entweichende Gas über Ba (OH)₂-Lösung geleitet und dabei CO₂ erkannt wurde, eine braune Lösung, aus der sich beim Erkalten schön ausgebildete gelbe Nadeln abschieden, die abfiltriert und mit Äther gewaschen wurden. Nach Einengen des Filtrates auf die Hälfte und Zugabe von Toluol ließ sich die Ausbeute an Rohprodukt auf 2,5 g erhöhen; bei weiterem Einengen zeigten sich jedoch sehr bald Schmierer, wie die relativ schlechte Ausbeute überhaupt auf Verharzung zurückgeführt werden muß. Die Nadeln wurden in heißem Benzol aufgenommen und fielen beim Erkalten farblos und seidig aus.

Smp. 352—353°.

Analys[e:

5,333 mg Subst.: 17,810 mg CO₂, 2,460 mg H₂O

2,988 mg Subst.: 0,092 ccm N₂


Gef.: 91,08% C 5,16% H, 3,52% N

Ber.: C₃₄H₂₃N : 91,63% C 5,21% H, 3,52% N

Das Produkt zeigt mit conc. Schwefelsäure eine zunächst gelbe Halochromie. Läßt man die Lösung 1—2 Stunden stehen, so ist eine grüne Fluoreszenz zu erkennen, die nach längerem Stehen intensiver wird. Eine angefeuchtete Probe wurde nach 12-stündigem Stehen, wobei sie tiefgrün geworden war, auf Eis filtriert. Es setzte sich ein gelbes Produkt ab, das nach 2-tägigem Stehen filtriert wurde und dann nach dem Trocknen im Trockenschrank (ca. 100°) eine braune gallertartige Masse gab, die sich in Methylalkohol mit gelb-brauner Farbe löste. Nach hinreichendem Einengen im Vakuum schieden sich hellbraune Flocken ab, die aus Benzol oder Toluol ein gelbes, mikrokristallines Produkt in sehr schlechter Ausbeute lieferten, das sich zwischen 240—250° unter vorausgehender Braunfärbung zersetzt und mit Schwefelsäure eine gelbe Färbung zeigt.

Das Triphenyl-biphenylen-pyrrol kann auch aus Phencyclon und Nitrobenzol erhalten werden. Erhitzt man die beiden Reaktionspartner in einem Kölbchen mit Steigrohr, so setzt bei 60—70° eine lebhafte CO₂-Entwicklung ein, die ohne weitere Wärmezufuhr weiterverläuft. Die Reaktion setzt sich durch die ganze Masse fort, bis nach wenigen Stunden eine homogene, rotbraune Schmelze gebildet ist. Nachdem sublimiertes Nitrobenzol aus dem oberen Teil des Reaktionsgefäßes entfernt ist, kocht man die Masse unter Rückfluß mit Benzol auf und filtriert heiß von einem eventuell verbleibenden Rückstand ab. Nach einigem Stehen scheidet sich aus dem Filtrat ein rotbraunes kristallines Produkt ab, das nach Umkristallisieren aus Benzol seine Färbung verliert, bei 352° schmilzt, die gelbe später grün fluoreszierende Halochromie zeigt und mit den aus Phencyclon und Nitrobenzol erhaltenen Nadel keine Schmelzpunktdepression gibt.

2-Benzoyl-3,6-diphenyl-4,5-biphenylen-pyridin
aus Phencyclon + Benzocyanyd.



Man erhitzt 3 g Phencyclon mit 3 g Benzocyanyd unter Einleiten von CO_2 im Ölbad. Zwischen 190 und 200° beginnt eine Gasentwicklung, während gleichzeitig die grüne Farbe der Schmelze in Braun übergeht. Ist die Gasentwicklung beendet — ca. 15 Minuten —, so läßt man erkalten, kocht die sirupartige Masse mit Äther aus und löst das verbleibende braune Produkt in heißem Benzol auf. Aus der Lösung lassen sich mit Methylalkohol schwach gefärbte Flocken ausfällen, die, aus Benzol umkristallisiert, farblose dünne Nadeln liefern, die bei $248-250^\circ$ unter Braunfärbung schmelzen.

Mit conc. H_2SO_4 tritt Rotfärbung ein; gießt man die Lösung in Wasser, so scheiden sich schwachgelbe Flocken ab.

Stickstoff-Bestimmung:

2,680 mg Subst.: 0,072 ccm N_2 ($753/25,5$)

Ber.: $\text{C}_{30}\text{H}_{28}\text{NO}$: 2,89% N

Gef.: 3,05% N

Lebenslauf.

Am 8. Mai 1911 wurde ich, August Schaefer, evangelischer Konfession, als Sohn des Kaufmanns Gustav Schaefer und seiner Ehefrau Else geb. Böhm, zu Offenbach am Main geboren.

Nach dem Besuch der Volksschule zu Mühlheim a. Main trat ich Ostern 1921 in die Ober-Realschule zu Offenbach ein, die ich im März 1929 mit dem Zeugnis der Reife verließ.

Im Sommersemester 1929 begann ich in Heidelberg mit dem Studium der Chemie, setzte es im Wintersemester 1929/30 in Frankfurt fort und bezog Ostern 1930 die Universität in Bonn. Hier bestand ich im Sommersemester 1932 das erste und Ende Wintersemester 1933/34 das zweite Verbandsexamen für Chemiker.

Unter Leitung von Herrn Professor Dr. W. Dilthey begann ich im April 1934 die vorliegende Arbeit, die im November 1935 beendet wurde.

Die mündliche Prüfung fand am 19. Febr. 1936 statt.

